
# LK-NEWAY MAMBO ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **ESPM000101976708**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **ES0101976708**<br>NUMER | **2002-09-05**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **620** | 0.72 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **35** | 0.76 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **809** | 0.73 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **807** | 0.68 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **942** | 0.73 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1049** | 0.65 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1168** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-182** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **19.5** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **0.3** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.1** | 0.74 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **171** | 0.80 |
| LICZBA OBÓR | **126** | 0.80 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **84** | 0.58 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **76** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **78** | 0.82 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **81** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 173 | 125 |
| wymię | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 173 | 125 |
| budowa ogólna | MACE | **91** | niepożądana | | pożądana | 0.65 | 173 | 125 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **94** | niski | | wysoki | 0.90 | 173 | 125 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.75 | 173 | 125 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **65** | wąska | | szeroka | 0.76 | 173 | 125 |
| ustawienie zadu | MACE | **84** | uniesiony | | spadzisty | 0.85 | 173 | 125 |
| szerokość zadu | MACE | **112** | wąski | | szeroki | 0.82 | 173 | 125 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **132** | pionowa | | podsiebna | 0.81 | 173 | 125 |
| racice | MACE | **77** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.68 | 173 | 125 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **97** | iksowate | | równolegle | 0.67 | 173 | 125 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **89** | luźne | | mocne | 0.73 | 173 | 125 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.75 | 173 | 125 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **98** | słabe | | mocne | 0.70 | 173 | 125 |
| położenie wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.86 | 173 | 125 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **85** | szerokie | | wąskie | 0.87 | 173 | 125 |
| długość strzyków | MACE | **76** | krótkie | | długie | 0.89 | 173 | 125 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **105** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.87 | 173 | 125 |
| charakter mleczny | MACE | **108** | ordynarny | | szlachetny | 0.70 | 173 | 125 |
| kondycja | MACE | **66** | słaba | | mocna | 0.76 | 173 | 125 |
| lokomocja | MACE | **98** | słaba | | dobra | 0.51 | 148 | 104 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **114** | | | | 0.46 | 97 | 78 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.40 | 29 | 18 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **104** | | | | 0.46 | 47 | 32 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |