
# LLERA WILSON DI STEFANO ET

NAZWA

| ESPM009402743665 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| ES9402743665 | 2006-05-01 |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **630** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-149** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **899** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **951** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1034** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1044** | 0.65 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-862** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-225** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-17.2** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.09** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.3** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **98** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **79** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **92** | 0.47 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **95** | 0.53 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **86** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 98 | 79 |
| wymię | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 98 | 79 |
| budowa ogólna | MACE | **97** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 98 | 79 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **91** | niski | | wysoki | 0.87 | 98 | 79 |
| głębokość tułowia | MACE | **104** | płytki | | głęboki | 0.70 | 98 | 79 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **91** | wąska | | szeroka | 0.70 | 98 | 79 |
| ustawienie zadu | MACE | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 98 | 79 |
| szerokość zadu | MACE | **100** | wąski | | szeroki | 0.78 | 98 | 79 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **96** | pionowa | | podsiebna | 0.74 | 98 | 79 |
| racice | MACE | **115** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.61 | 98 | 79 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **92** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 98 | 79 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **97** | luźne | | mocne | 0.68 | 98 | 79 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **107** | niskie | | wysokie | 0.70 | 98 | 79 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **97** | słabe | | mocne | 0.65 | 98 | 79 |
| położenie wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.82 | 98 | 79 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **101** | szerokie | | wąskie | 0.83 | 98 | 79 |
| długość strzyków | MACE | **112** | krótkie | | długie | 0.86 | 98 | 79 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **106** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.83 | 98 | 79 |
| charakter mleczny | MACE | **97** | ordynarny | | szlachetny | 0.65 | 98 | 79 |
| kondycja | MACE | **95** | słaba | | mocna | 0.70 | 98 | 79 |
| lokomocja | MACE | **99** | słaba | | dobra | 0.41 | 85 | 69 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **92** | | | | 0.30 | 65 | 59 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |