
# KOIVURANNAN TOMERA TV
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FINM000000093804**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FI93804**<br>NUMER | **2004-01-08**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **652** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **3** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **894** | 0.62 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **866** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **977** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1075** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-723** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-232** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-10.2** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **-0.01** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **7.3** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.17** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **179** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **167** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **93** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **88** | 0.51 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **85** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **85** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.34 | 62 | 57 |
| wymię | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.48 | 62 | 57 |
| budowa ogólna | MACE | **92** | niepożądana | | pożądana | 0.50 | 62 | 57 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **83** | niski | | wysoki | 0.83 | 62 | 57 |
| głębokość tułowia | MACE | **101** | płytki | | głęboki | 0.69 | 62 | 57 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **95** | wąska | | szeroka | 0.61 | 62 | 57 |
| ustawienie zadu | MACE | **97** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 62 | 57 |
| szerokość zadu | MACE | **104** | wąski | | szeroki | 0.72 | 62 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **76** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 62 | 57 |
| racice | MACE | **108** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 62 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **94** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 62 | 57 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **104** | luźne | | mocne | 0.65 | 62 | 57 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.64 | 62 | 57 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **90** | słabe | | mocne | 0.60 | 62 | 57 |
| położenie wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.78 | 62 | 57 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **106** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 62 | 57 |
| długość strzyków | MACE | **88** | krótkie | | długie | 0.84 | 62 | 57 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **108** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 62 | 57 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **88** | słaba | | dobra | 0.32 | 62 | 57 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **108** | | | | 0.37 | 127 | 121 |
| temperament | MACE | **114** | | | | 0.21 | 125 | 120 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.38 | 72 | 70 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **107** | | | | 0.58 | 133 | 126 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.43 | 178 | 167 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **124** | | > | | 0.59 | 169 | 159 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |