
| SUZOLET |
|---|
| NAZWA |

| FRAM001522074099 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| FR1522074099 | 2001-12-16 |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **645** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **13** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **901** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **910** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **916** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **965** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-85** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **147** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-8.9** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.16** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **8.1** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **101** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **104** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **84** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **88** | 0.50 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **81** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **80** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 63 | 60 |
| wymię | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 63 | 60 |
| budowa ogólna | MACE | **77** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 63 | 60 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **81** | niski | | wysoki | 0.84 | 63 | 60 |
| głębokość tułowia | MACE | **81** | płytki | | głęboki | 0.58 | 63 | 60 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **83** | wąska | | szeroka | 0.66 | 63 | 60 |
| ustawienie zadu | MACE | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 63 | 60 |
| szerokość zadu | MACE | **83** | wąski | | szeroki | 0.76 | 63 | 60 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **96** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 63 | 60 |
| racice | MACE | **93** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 63 | 60 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **84** | iksowate | | równolegle | 0.59 | 63 | 60 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **91** | luźne | | mocne | 0.69 | 63 | 60 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.66 | 63 | 60 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **76** | słabe | | mocne | 0.57 | 63 | 60 |
| położenie wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.80 | 63 | 60 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **65** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 63 | 60 |
| długość strzyków | MACE | **95** | krótkie | | długie | 0.74 | 63 | 60 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **79** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 63 | 60 |
| charakter mleczny | MACE | **88** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 63 | 60 |
| kondycja | MACE | **106** | słaba | | mocna | 0.53 | 17 | 17 |
| lokomocja | MACE | **84** | słaba | | dobra | 0.45 | 63 | 60 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **90** | | | | 0.40 | 63 | 60 |
| temperament | MACE | **87** | | | | 0.30 | 63 | 60 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.42 | 227 | 208 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **87** | | | | 0.43 | 153 | 104 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.32 | 218 | 208 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 100 | | | | 0.41 | 145 | 104 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |