
| UCLAIS | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM002216255526**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR2216255526**<br>NUMER | **2003-04-07**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **607** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **7** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **833** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **744** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **947** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1060** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-601** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **495** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **6.6** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.14** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-3.2** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.21** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **71** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **72** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **78** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **62** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **70** | 0.45 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.71 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.49 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 88 | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 59 | 57 |
| wymię | MACE | 84 | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 59 | 57 |
| budowa ogólna | MACE | 94 | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 59 | 57 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 92 | niski | | wysoki | 0.83 | 59 | 57 |
| głębokość tułowia | MACE | 102 | płytki | | głęboki | 0.57 | 59 | 57 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 94 | wąska | | szeroka | 0.65 | 59 | 57 |
| ustawienie zadu | MACE | 87 | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 59 | 57 |
| szerokość zadu | MACE | 114 | wąski | | szeroki | 0.74 | 59 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 116 | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 59 | 57 |
| racice | MACE | 95 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.51 | 59 | 57 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 109 | iksowate | | równolegle | 0.57 | 59 | 57 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 89 | luźne | | mocne | 0.68 | 59 | 57 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 91 | niskie | | wysokie | 0.65 | 59 | 57 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 88 | słabe | | mocne | 0.56 | 59 | 57 |
| położenie wymienia | MACE | 75 | niskie | | wysokie | 0.78 | 59 | 57 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 117 | szerokie | | wąskie | 0.75 | 59 | 57 |
| długość strzyków | MACE | 97 | krótkie | | długie | 0.73 | 59 | 57 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 107 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 59 | 57 |
| charakter mleczny | MACE | 100 | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 59 | 57 |
| kondycja | MACE | 88 | słaba | | mocna | 0.67 | 59 | 57 |
| lokomocja | MACE | 87 | słaba | | dobra | 0.45 | 59 | 57 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | 114 | | | | 0.39 | 59 | 57 |
| temperament | MACE | 94 | | | | 0.29 | 59 | 57 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 100 | | | | 0.42 | 182 | 144 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | 94 | | | | 0.41 | 148 | 72 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | 108 | | | | 0.32 | 176 | 144 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 99 | | | | 0.39 | 141 | 72 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |