| REDOR | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM002254671470** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **FR2254671470** NUMER | **2000-10-19** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **582** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **33** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **740** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **807** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **885** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **932** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1118** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **178** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-0.7** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.08** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **5.9** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **66** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **66** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **98** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **72** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **90** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **82** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **72** | 0.72 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **72** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **76** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 49 | 48 |
| wymię | MACE | **82** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 49 | 48 |
| budowa ogólna | MACE | **74** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 49 | 48 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **86** | niski | | wysoki | 0.82 | 49 | 48 |
| głębokość tułowia | MACE | **95** | płytki | | głęboki | 0.57 | 49 | 48 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **112** | wąska | | szeroka | 0.63 | 49 | 48 |
| ustawienie zadu | MACE | **106** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 49 | 48 |
| szerokość zadu | MACE | **81** | wąski | | szeroki | 0.73 | 49 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **119** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 49 | 48 |
| racice | MACE | **81** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | 49 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **83** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 49 | 48 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **84** | luźne | | mocne | 0.67 | 49 | 48 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.64 | 49 | 48 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **85** | słabe | | mocne | 0.56 | 49 | 48 |
| położenie wymienia | MACE | **84** | niskie | | wysokie | 0.77 | 49 | 48 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **89** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 49 | 48 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.72 | 49 | 48 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **87** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 49 | 48 |
| charakter mleczny | MACE | **82** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 49 | 48 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **78** | słaba | | dobra | 0.43 | 49 | 48 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **94** | | | | 0.38 | 49 | 48 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.27 | 49 | 48 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.40 | 173 | 132 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **71** | | | | 0.40 | 136 | 66 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.31 | 170 | 132 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 72 | < | | | 0.38 | 135 | 66 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |