
| CIMOULET | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM002922492887**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR2922492887**<br>NUMER | **2007-08-19**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **667** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-30** | 0.72 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **907** | 0.63 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1011** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **959** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1036** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-198** | 0.71 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **432** | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-8.8** | 0.74 |
| % TŁUSZCZU | **-0.27** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **0.8** | 0.71 |
| % BIAŁKA | **-0.14** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **127** | 0.79 |
| LICZBA OBÓR | **125** | 0.79 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **111** | 0.42 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **109** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **82** | 0.68 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.51 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **92** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **91** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **93** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 47 | 43 |
| wymię | MACE | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 47 | 43 |
| budowa ogólna | MACE | **84** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 47 | 43 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **93** | niski | | wysoki | 0.82 | 47 | 43 |
| głębokość tułowia | MACE | **99** | płytki | | głęboki | 0.57 | 47 | 43 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **91** | wąska | | szeroka | 0.63 | 47 | 43 |
| ustawienie zadu | MACE | **82** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 47 | 43 |
| szerokość zadu | MACE | **82** | wąski | | szeroki | 0.73 | 47 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **96** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 47 | 43 |
| racice | MACE | **90** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | 47 | 43 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **106** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 47 | 43 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **79** | luźne | | mocne | 0.67 | 47 | 43 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.64 | 47 | 43 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **97** | słabe | | mocne | 0.56 | 47 | 43 |
| położenie wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.77 | 47 | 43 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **75** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 47 | 43 |
| długość strzyków | MACE | **110** | krótkie | | długie | 0.72 | 47 | 43 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **83** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 47 | 43 |
| charakter mleczny | MACE | **95** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 47 | 43 |
| kondycja | MACE | **97** | słaba | | mocna | 0.66 | 47 | 43 |
| lokomocja | MACE | **95** | słaba | | dobra | 0.44 | 47 | 43 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.41 | 47 | 43 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.32 | 47 | 43 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.45 | 322 | 250 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **97** | | | | 0.45 | 230 | 125 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.35 | 298 | 250 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 108 | | | | 0.44 | 211 | 125 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |