
| SEPHORA | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM002929868627** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **FR2929868627** NUMER | **2001-03-03** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **584** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-34** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **730** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **825** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **971** | 0.62 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1009** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1119** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-357** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0.7** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.17** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-6.1** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.07** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **74** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **75** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.39 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **73** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **95** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **54** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 40 | 40 |
| wymię | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 40 | 40 |
| budowa ogólna | MACE | **95** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 40 | 40 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **96** | niski | | wysoki | 0.81 | 40 | 40 |
| głębokość tułowia | MACE | **115** | płytki | | głęboki | 0.58 | 40 | 40 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **104** | wąska | | szeroka | 0.63 | 40 | 40 |
| ustawienie zadu | MACE | **86** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 40 | 40 |
| szerokość zadu | MACE | **89** | wąski | | szeroki | 0.72 | 40 | 40 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **114** | pionowa | | podsiebna | 0.62 | 40 | 40 |
| racice | MACE | **115** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.51 | 40 | 40 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 40 | 40 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **98** | luźne | | mocne | 0.65 | 40 | 40 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.63 | 40 | 40 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **86** | słabe | | mocne | 0.56 | 40 | 40 |
| położenie wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.76 | 40 | 40 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **104** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 40 | 40 |
| długość strzyków | MACE | **125** | krótkie | | długie | 0.72 | 40 | 40 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **91** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 40 | 40 |
| charakter mleczny | MACE | **97** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 40 | 40 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **87** | słaba | | dobra | 0.44 | 40 | 40 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.38 | 40 | 40 |
| temperament | MACE | **93** | | | | 0.30 | 40 | 40 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.43 | 227 | 150 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **89** | | | | 0.42 | 191 | 75 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.33 | 214 | 150 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 86 | | | | 0.40 | 180 | 75 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |