
| BONALD | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM002938051859** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **FR2938051859** NUMER | **2006-06-22** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **738** | 0.59 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **241** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1010** | 0.54 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **786** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1018** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1033** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **579** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **207** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **30.2** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **0.24** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **20** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **0.14** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **69** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **53** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.43 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **80** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **74** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **73** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.72 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **103** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **103** | niepożądane | | pożądane | 0.42 | 32 | 25 |
| wymię | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.55 | 32 | 25 |
| budowa ogólna | MACE | **97** | niepożądana | | pożądana | 0.54 | 32 | 25 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **89** | niski | | wysoki | 0.79 | 32 | 25 |
| głębokość tułowia | MACE | **105** | płytki | | głęboki | 0.62 | 32 | 25 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **95** | wąska | | szeroka | 0.63 | 32 | 25 |
| ustawienie zadu | MACE | **86** | uniesiony | | spadzisty | 0.71 | 32 | 25 |
| szerokość zadu | MACE | **104** | wąski | | szeroki | 0.70 | 32 | 25 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **95** | pionowa | | podsiebna | 0.62 | 32 | 25 |
| racice | MACE | **97** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.49 | 32 | 25 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **110** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 32 | 25 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **86** | luźne | | mocne | 0.67 | 32 | 25 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.63 | 32 | 25 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **86** | słabe | | mocne | 0.57 | 32 | 25 |
| położenie wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.75 | 32 | 25 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **97** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 32 | 25 |
| długość strzyków | MACE | **91** | krótkie | | długie | 0.78 | 32 | 25 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **102** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 32 | 25 |
| charakter mleczny | MACE | **103** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 32 | 25 |
| kondycja | MACE | **89** | słaba | | mocna | 0.64 | 32 | 25 |
| lokomocja | MACE | **106** | słaba | | dobra | 0.39 | 32 | 25 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.40 | 26 | 21 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.32 | 24 | 19 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.46 | 60 | 33 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **96** | | | | 0.43 | 25 | 20 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.40 | 238 | 108 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 100 | | | | 0.54 | 55 | 42 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |