
| PEYNIER | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM002941264106**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR2941264106**<br>NUMER | **1999-10-15**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **597** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-160** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **907** | 0.53 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **875** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **952** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1005** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-939** | 0.66 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-374** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-16.7** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.02** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.5** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.03** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **71** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **72** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **109** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **74** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **82** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.72 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **84** | 0.49 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **92** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 48 | 47 |
| wymię | MACE | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 48 | 47 |
| budowa ogólna | MACE | **84** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 48 | 47 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **76** | niski | | wysoki | 0.82 | 48 | 47 |
| głębokość tułowia | MACE | **85** | płytki | | głęboki | 0.57 | 48 | 47 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **81** | wąska | | szeroka | 0.63 | 48 | 47 |
| ustawienie zadu | MACE | **91** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 48 | 47 |
| szerokość zadu | MACE | **89** | wąski | | szeroki | 0.73 | 48 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 48 | 47 |
| racice | MACE | **86** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | 48 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **83** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 48 | 47 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **90** | luźne | | mocne | 0.66 | 48 | 47 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.63 | 48 | 47 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **112** | słabe | | mocne | 0.56 | 48 | 47 |
| położenie wymienia | MACE | **91** | niskie | | wysokie | 0.77 | 48 | 47 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **106** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 48 | 47 |
| długość strzyków | MACE | **75** | krótkie | | długie | 0.72 | 48 | 47 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **125** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 48 | 47 |
| charakter mleczny | MACE | **92** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 48 | 47 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **92** | słaba | | dobra | 0.44 | 48 | 47 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.40 | 48 | 47 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.30 | 48 | 47 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.42 | 154 | 144 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **94** | | | | 0.42 | 116 | 72 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **116** | | | | 0.40 | 106 | 72 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |