
# GENUS LEIGHTON

NAZWA

| | |
|---|---|
| FRAM002994001299<br>NUMER MIĘDZ. | HO<br>RASA |
| FR2994001299<br>NUMER | 1994-12-04<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| INDEKS PF | 593 | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | -238 | 0.80 |
| PODINDEKS ZDROWIA | 860 | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | 991 | 0.43 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | 982 | 0.54 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | 1036 | 0.43 |
| INDEKS EKONOMICZNY [PLN] | -1641 | 0.73 |

W wartość
P powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | -707 | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | -21.6 | 0.82 |
| % TŁUSZCZU | 0.08 | 0.82 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | -25.3 | 0.79 |
| % BIAŁKA | -0.02 | 0.79 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | 100 | 0.40 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | 97 | 0.47 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | 100 | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | 85 | 0.82 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | 83 | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | 103 | niepożądane | | pożądane | 0.43 | - | - |
| wymię | I | 87 | niepożądane | | pożądane | 0.53 | - | - |
| budowa ogólna | I | 89 | niepożądana | | pożądana | 0.54 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | 97 | niski | | wysoki | 0.72 | - | - |
| głębokość tułowia | I | 106 | płytki | | głęboki | 0.63 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | 108 | wąska | | szeroka | 0.62 | - | - |
| ustawienie zadu | I | 98 | uniesiony | | spadzisty | 0.63 | - | - |
| szerokość zadu | I | 101 | wąski | | szeroki | 0.62 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | 90 | pionowa | | podsiebna | 0.55 | - | - |
| racice | I | 98 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.50 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | I | 98 | iksowate | | równolegle | 0.40 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | 99 | luźne | | mocne | 0.62 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | 89 | niskie | | wysokie | 0.57 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | 96 | słabe | | mocne | 0.51 | - | - |
| położenie wymienia | I | 95 | niskie | | wysokie | 0.68 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | 68 | szerokie | < | wąskie | 0.73 | - | - |
| długość strzyków | I | 124 | krótkie | > | długie | 0.73 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | - | - | zewnętrzne | | wewnętrzne | | - | - |
| charakter mleczny | I | 96 | ordynarny | | szlachetny | 0.64 | - | - |
| kondycja | I | 109 | słaba | | mocna | 0.67 | - | - |
| lokomocja | I | 103 | słaba | | dobra | 0.43 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | 92 | | | | 0.32 | 28 | 25 |
| temperament | MACE | 98 | | | | 0.24 | 28 | 25 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | 89 | | | | 0.30 | 86 | 59 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |