
| JORIA | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM002994037124** NUMER MIĘDZ. | **HO** RASA |
| **FR2994037124** NUMER | **1994-10-22** DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **612** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **131** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **756** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **778** | 0.48 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **850** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1007** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1175** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-727** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **38.7** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.82** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.24** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **83** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **82** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **82** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **81** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **65** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **77** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **85** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **63** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **69** | niepożądane | | pożądane | 0.37 | 14 | 13 |
| wymię | MACE | **73** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 66 | 63 |
| budowa ogólna | MACE | **76** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 66 | 63 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **85** | niski | | wysoki | 0.84 | 66 | 63 |
| głębokość tułowia | MACE | **90** | płytki | | głęboki | 0.49 | 66 | 63 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **87** | wąska | | szeroka | 0.50 | 14 | 13 |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 66 | 63 |
| szerokość zadu | MACE | **97** | wąski | | szeroki | 0.58 | 66 | 63 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **109** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 66 | 63 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **82** | luźne | | mocne | 0.69 | 66 | 63 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.66 | 66 | 63 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **85** | słabe | | mocne | 0.58 | 66 | 63 |
| położenie wymienia | MACE | **79** | niskie | | wysokie | 0.80 | 66 | 63 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **71** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 66 | 63 |
| długość strzyków | MACE | **104** | krótkie | | długie | 0.74 | 66 | 63 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **81** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 66 | 63 |
| charakter mleczny | MACE | **90** | ordynarny | | szlachetny | 0.43 | 14 | 13 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **80** | słaba | | dobra | 0.33 | 14 | 13 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **95** | | | | 0.36 | 66 | 63 |
| temperament | MACE | **101** | | | | 0.22 | 66 | 63 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.31 | 60 | 60 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **100** | | | | 0.38 | 29 | 29 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |