
| PEKINOIS | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM003556861802**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR3556861802**<br>NUMER | **1999-10-16**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **611** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-85** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **871** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **873** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **983** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **964** | 0.47 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-544** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **52** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-10.1** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.13** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.5** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **101** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **99** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **93** | 0.38 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **86** | 0.52 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **82** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.49 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **78** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 68 | 62 |
| wymię | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 68 | 62 |
| budowa ogólna | MACE | **84** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 68 | 62 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **79** | niski | | wysoki | 0.85 | 68 | 62 |
| głębokość tułowia | MACE | **80** | płytki | | głęboki | 0.60 | 68 | 62 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.68 | 68 | 62 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 68 | 62 |
| szerokość zadu | MACE | **93** | wąski | | szeroki | 0.77 | 68 | 62 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **107** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 68 | 62 |
| racice | MACE | **100** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.55 | 68 | 62 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **117** | iksowate | | równolegle | 0.60 | 68 | 62 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **89** | luźne | | mocne | 0.71 | 68 | 62 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.67 | 68 | 62 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **86** | słabe | | mocne | 0.59 | 68 | 62 |
| położenie wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.81 | 68 | 62 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **79** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 68 | 62 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.76 | 68 | 62 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **71** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 68 | 62 |
| charakter mleczny | MACE | **84** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 68 | 62 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **106** | słaba | | dobra | 0.45 | 68 | 62 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **83** | | | | 0.35 | 68 | 62 |
| temperament | MACE | **98** | | | | 0.20 | 68 | 62 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.41 | 271 | 198 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **77** | | | | 0.42 | 215 | 99 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.30 | 245 | 198 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 86 | | | | 0.40 | 192 | 99 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |