
# NORSTAR
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM003597000297**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR3597000297**<br>NUMER | **1997-04-18**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **627** | 0.51 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-83** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **867** | 0.53 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **944** | 0.39 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **963** | 0.43 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1022** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1154** | 0.61 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-705** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-9.4** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **0.23** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.5** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **0.19** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **40** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **34** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **93** | 0.30 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **86** | 0.36 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **107** | 0.43 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.43 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.68 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **84** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.38 | 17 | 16 |
| wymię | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 17 | 16 |
| budowa ogólna | MACE | **96** | niepożądana | | pożądana | 0.42 | 17 | 16 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **89** | niski | | wysoki | 0.56 | 17 | 16 |
| głębokość tułowia | MACE | **99** | płytki | | głęboki | 0.47 | 17 | 16 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **94** | wąska | | szeroka | 0.47 | 17 | 16 |
| ustawienie zadu | MACE | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.51 | 17 | 16 |
| szerokość zadu | MACE | **100** | wąski | | szeroki | 0.50 | 17 | 16 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **120** | pionowa | | podsiebna | 0.46 | 17 | 16 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **88** | iksowate | | równolegle | 0.40 | 17 | 16 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **96** | luźne | | mocne | 0.50 | 17 | 16 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.43 | 17 | 16 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **109** | słabe | | mocne | 0.44 | 17 | 16 |
| położenie wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.53 | 17 | 16 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **107** | szerokie | | wąskie | 0.50 | 17 | 16 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.54 | 17 | 16 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.49 | 17 | 16 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **91** | | | | 0.37 | 31 | 28 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **89** | | | | 0.37 | 88 | 24 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **100** | | | | 0.44 | 35 | 31 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.35 | 88 | 24 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |