
# REXEL JOC
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM004437471633**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR4437471633**<br>NUMER | **2000-12-31**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **649** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-68** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **920** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **928** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1018** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1007** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-359** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **268** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-16.2** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.29** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-0.5** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.1** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **66** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **69** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.41 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **98** | 0.50 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **87** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **86** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.73 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **90** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **107** | niepożądane | | | | pożądane | 0.44 | 37 | 36 |
| wymię | MACE | **94** | niepożądane | | | | pożądane | 0.57 | 37 | 36 |
| budowa ogólna | MACE | **93** | niepożądana | | | | pożądana | 0.59 | 37 | 36 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **99** | niski | | | | wysoki | 0.80 | 37 | 36 |
| głębokość tułowia | MACE | **92** | płytki | | | | głęboki | 0.56 | 37 | 36 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **89** | wąska | | | | szeroka | 0.61 | 37 | 36 |
| ustawienie zadu | MACE | **124** | uniesiony | | | > | spadzisty | 0.71 | 37 | 36 |
| szerokość zadu | MACE | **92** | wąski | | | | szeroki | 0.70 | 37 | 36 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **78** | pionowa | < | | | podsiebna | 0.60 | 37 | 36 |
| racice | MACE | **106** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.49 | 37 | 36 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **117** | iksowate | | | | równolegle | 0.55 | 37 | 36 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **85** | luźne | | | | mocne | 0.64 | 37 | 36 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **100** | niskie | | | | wysokie | 0.61 | 37 | 36 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **99** | słabe | | | | mocne | 0.55 | 37 | 36 |
| położenie wymienia | MACE | **84** | niskie | | | | wysokie | 0.74 | 37 | 36 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **93** | szerokie | | | | wąskie | 0.71 | 37 | 36 |
| długość strzyków | MACE | **119** | krótkie | | | | długie | 0.70 | 37 | 36 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **101** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.72 | 37 | 36 |
| charakter mleczny | MACE | **99** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.50 | 37 | 36 |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **105** | słaba | | | | dobra | 0.44 | 37 | 36 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.41 | 37 | 36 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.33 | 37 | 36 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **93** | | | | 0.45 | 195 | 124 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **99** | | | | 0.42 | 152 | 69 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.36 | 184 | 138 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 110 | | | | 0.41 | 141 | 69 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |