| SITREIL HL |
|---|
| NAZWA |

| FRAM004437471747 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **FR4437471747** | **2001-11-03** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **582** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-51** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **785** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **813** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **946** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **962** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1209** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-244** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-1.5** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.09** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.4** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **0.01** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **77** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **80** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **69** | 0.51 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **95** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **82** | 0.49 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **81** | 0.74 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **67** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.44 | 50 | 48 |
| wymię | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 50 | 48 |
| budowa ogólna | MACE | **89** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 50 | 48 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **87** | niski | | wysoki | 0.82 | 50 | 48 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.58 | 50 | 48 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **98** | wąska | | szeroka | 0.64 | 50 | 48 |
| ustawienie zadu | MACE | **91** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 50 | 48 |
| szerokość zadu | MACE | **71** | wąski | | szeroki | 0.74 | 50 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **124** | pionowa | | podsiebna | 0.64 | 50 | 48 |
| racice | MACE | **102** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.51 | 50 | 48 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **85** | iksowate | | równolegle | 0.57 | 50 | 48 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **88** | luźne | | mocne | 0.67 | 50 | 48 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.64 | 50 | 48 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **91** | słabe | | mocne | 0.57 | 50 | 48 |
| położenie wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.78 | 50 | 48 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **90** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 50 | 48 |
| długość strzyków | MACE | **102** | krótkie | | długie | 0.73 | 50 | 48 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 50 | 48 |
| charakter mleczny | MACE | **102** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 50 | 48 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **82** | słaba | | dobra | 0.45 | 50 | 48 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **98** | | | | 0.40 | 50 | 48 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.29 | 50 | 48 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **88** | | | | 0.43 | 213 | 148 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **80** | | | | 0.42 | 179 | 80 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **80** | | | | 0.33 | 199 | 160 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 85 | | | | 0.41 | 163 | 80 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |