
# LEGATO JAB
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM004495050084**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **PL000609174842**<br>NUMER | **1995-04-23**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **626** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **22** | 0.84 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **903** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **789** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **923** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **972** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-394** | 0.78 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-139** | 0.87 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **6.1** | 0.85 |
| % TŁUSZCZU | **0.13** | 0.85 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-0.5** | 0.83 |
| % BIAŁKA | **0.05** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-23.1** | 0.34 |
| % LAKTOZY | **-0.18** | 0.34 |
| LICZBA CÓREK | **1** | 0.87 |
| LICZBA OBÓR | **1** | 0.87 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **85** | 0.44 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **71** | 0.52 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.66 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **81** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.88 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **82** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | I | **84** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | - | - |
| wymię | I | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | - | - |
| budowa ogólna | I | **79** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **72** | niski | | wysoki | 0.84 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **100** | płytki | | głęboki | 0.60 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | I | **91** | wąska | | szeroka | 0.67 | - | - |
| ustawienie zadu | I | **87** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | - | - |
| szerokość zadu | I | **94** | wąski | | szeroki | 0.74 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **105** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | - | - |
| racice | I | **92** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **80** | luźne | | mocne | 0.73 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **90** | niskie | | wysokie | 0.68 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **85** | słabe | | mocne | 0.60 | - | - |
| położenie wymienia | I | **88** | niskie | | wysokie | 0.81 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **99** | szerokie | | wąskie | 0.83 | - | - |
| długość strzyków | I | **106** | krótkie | | długie | 0.79 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **107** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.80 | - | - |
| charakter mleczny | I | **82** | ordynarny | | szlachetny | 0.67 | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | I | **77** | słaba | | dobra | 0.52 | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **104** | | | | 0.40 | 73 | 74 |
| temperament | MACE | **104** | | | | 0.29 | 73 | 74 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.40 | 138 | 138 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **93** | | | | 0.44 | 69 | 69 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 85 | | | | 0.41 | 35 | 35 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |