# CHOLET NED
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM004987011015**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR4987011015**<br>NUMER | **1987-05-04**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **529** | 0.66 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-358** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **912** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **967** | 0.68 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **781** | 0.72 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **980** | 0.65 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1697** | 0.70 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1119** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-44.3** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.01** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-30.1** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **90** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **102** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **103** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **76** | 0.49 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | MACE | **64** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 55 | 52 |
| budowa ogólna | - | - | niepożądana | | pożądana | | - | - |
| wysokość w krzyżu | MACE | **73** | niski | | wysoki | 0.82 | 55 | 52 |
| głębokość tułowia | - | - | płytki | | głęboki | | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | - | - | wąska | | szeroka | | - | - |
| ustawienie zadu | MACE | **93** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 55 | 52 |
| szerokość zadu | - | - | wąski | | szeroki | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **107** | pionowa | | podsiebna | 0.64 | 55 | 52 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | - | - | luźne | | mocne | | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | - | - | niskie | | wysokie | | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **64** | słabe | | mocne | 0.55 | 55 | 52 |
| położenie wymienia | MACE | **72** | niskie | | wysokie | 0.78 | 55 | 52 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **74** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 55 | 52 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.72 | 55 | 52 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **68** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 55 | 52 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | 0.34 | 55 | 52 |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |