
| LIPIDE BES | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM004995023768**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR4995023768**<br>NUMER | **1995-09-11**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **696** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **96** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **990** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **862** | 0.51 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **950** | 0.69 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1043** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-66** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-90** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **16.4** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.22** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **5.1** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **111** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **112** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **108** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **80** | 0.51 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.65 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **85** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **98** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **103** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **89** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 87 | 83 |
| wymię | MACE | **83** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 96 | 91 |
| budowa ogólna | MACE | **82** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 96 | 91 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **85** | niski | | wysoki | 0.86 | 96 | 91 |
| głębokość tułowia | MACE | **101** | płytki | | głęboki | 0.58 | 96 | 91 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **101** | wąska | | szeroka | 0.68 | 87 | 83 |
| ustawienie zadu | MACE | **87** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 96 | 91 |
| szerokość zadu | MACE | **93** | wąski | | szeroki | 0.77 | 96 | 91 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **102** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 96 | 91 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **81** | luźne | | mocne | 0.71 | 96 | 91 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.68 | 96 | 91 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | mocne | 0.58 | 96 | 91 |
| położenie wymienia | MACE | **83** | niskie | | wysokie | 0.82 | 96 | 91 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **78** | szerokie | | wąskie | 0.78 | 96 | 91 |
| długość strzyków | MACE | **105** | krótkie | | długie | 0.76 | 96 | 91 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **96** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.80 | 96 | 91 |
| charakter mleczny | MACE | **94** | ordynarny | | szlachetny | 0.50 | 87 | 83 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **91** | słaba | | dobra | 0.43 | 87 | 83 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **88** | | | | 0.35 | 96 | 91 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.21 | 96 | 91 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.34 | 113 | 113 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **97** | | | | 0.41 | 38 | 38 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **106** | | | | 0.25 | 106 | 106 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 118 | | | | 0.38 | 36 | 36 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |