
# ITEMIZE
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM005193406494**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR5193406494**<br>NUMER | **1993-10-03**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **640** | 0.64 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **5** | 0.82 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **964** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **904** | 0.55 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **815** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **948** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-267** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **194** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **4.2** | 0.84 |
| % TŁUSZCZU | **-0.04** | 0.84 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-2** | 0.80 |
| % BIAŁKA | **-0.09** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | - | 0.84 |
| LICZBA OBÓR | - | 0.84 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.40 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **99** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **79** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.61 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **95** | 0.87 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **96** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | | | pożądane | | - | - |
| wymię | I | **69** | niepożądane | < | | | pożądane | 0.58 | - | - |
| budowa ogólna | - | - | niepożądana | | | | pożądana | | - | - |
| wysokość w krzyżu | I | **78** | niski | < | | | wysoki | 0.85 | - | - |
| głębokość tułowia | I | **75** | płytki | < | | | głęboki | 0.57 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | - | - | wąska | | | | szeroka | | - | - |
| ustawienie zadu | I | **96** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.78 | - | - |
| szerokość zadu | I | **97** | wąski | | | | szeroki | 0.71 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | I | **126** | pionowa | | | > | podsiebna | 0.70 | - | - |
| racice | I | **66** | długa przekątna | < | | | krótka przekątna | 0.51 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | I | **71** | luźne | < | | | mocne | 0.74 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | I | **82** | niskie | | | | wysokie | 0.68 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | I | **85** | słabe | | | | mocne | 0.61 | - | - |
| położenie wymienia | I | **83** | niskie | | | | wysokie | 0.82 | - | - |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | I | **85** | szerokie | | | | wąskie | 0.84 | - | - |
| długość strzyków | I | **89** | krótkie | | | | długie | 0.80 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | I | **91** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.81 | - | - |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **87** | | | | 0.29 | 77 | 75 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.10 | 77 | 75 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.34 | 180 | 180 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **87** | | | | 0.38 | 117 | 116 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 101 | | | | 0.33 | 31 | 31 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |