
# DAMBOU ISY
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM005344215808**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR5344215808**<br>NUMER | **2008-08-31**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **693** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **230** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **871** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **757** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1020** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1023** | 0.44 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **261** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **667** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **21** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.06** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **24.3** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **106** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **108** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **76** | 0.51 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **76** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **71** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **81** | 0.49 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **97** | niepożądane | | | | pożądane | 0.38 | 37 | 37 |
| wymię | MACE | **94** | niepożądane | | | | pożądane | 0.53 | 37 | 37 |
| budowa ogólna | MACE | **101** | niepożądana | | | | pożądana | 0.55 | 37 | 37 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **103** | niski | | | | wysoki | 0.79 | 37 | 37 |
| głębokość tułowia | MACE | **118** | płytki | | | | głęboki | 0.54 | 37 | 37 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **98** | wąska | | | | szeroka | 0.58 | 37 | 37 |
| ustawienie zadu | MACE | **128** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.70 | 37 | 37 |
| szerokość zadu | MACE | **96** | wąski | | | | szeroki | 0.69 | 37 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **89** | pionowa | | | | podsiebna | 0.58 | 37 | 37 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.45 | 37 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **113** | iksowate | | | | równolegle | 0.51 | 37 | 37 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **88** | luźne | | | | mocne | 0.62 | 37 | 37 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **106** | niskie | | | | wysokie | 0.58 | 37 | 37 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **91** | słabe | | | | mocne | 0.52 | 37 | 37 |
| położenie wymienia | MACE | **92** | niskie | | | | wysokie | 0.73 | 37 | 37 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **115** | szerokie | | | | wąskie | 0.70 | 37 | 37 |
| długość strzyków | MACE | **87** | krótkie | | | | długie | 0.69 | 37 | 37 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **117** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.70 | 37 | 37 |
| charakter mleczny | MACE | **110** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.46 | 37 | 37 |
| kondycja | MACE | **96** | słaba | | | | mocna | 0.61 | 37 | 37 |
| lokomocja | MACE | **101** | słaba | | | | dobra | 0.38 | 37 | 37 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **80** | | | | | | 0.36 | 37 | 37 |
| temperament | MACE | **113** | | | | | | 0.25 | 37 | 37 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **103** | | | | | | 0.38 | 238 | 204 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **93** | | | | | | 0.40 | 183 | 108 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **95** | | | | | | 0.28 | 238 | 216 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **104** | | | | 0.39 | 183 | 108 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |