# SUPERFAN
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM005357028362**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR5357028362**<br>NUMER | **2021-12-24**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **982** | 0.75 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **617** | 0.80 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1218** | 0.74 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **995** | 0.72 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1245** | 0.75 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1066** | 0.68 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **3399** | 0.78 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **1174** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **73.3** | 0.81 |
| % TŁUSZCZU | **0.26** | 0.81 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **53.9** | 0.80 |
| % BIAŁKA | **0.14** | 0.80 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **61** | 0.77 |
| % LAKTOZY | **0.04** | 0.77 |
| LICZBA CÓREK | **-** | 0.81 |
| LICZBA OBÓR | **-** | 0.81 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **112** | 0.61 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **100** | 0.68 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **96** | 0.76 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **97** | 0.74 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **131** | 0.81 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **115** | 0.74 |

## CECHY GENETYCZNE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1A2 | BLF | RP1F | CDF | CNF | AA | VRF | DPF |
| XIF | HH1F | HH3F | HH4F | HH5F | HH6F | HH7F | BB |
| LGBC | MFF | POF | POF | SCDC | | | |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | G | **133** | mały | > | duży | 0.67 | - | - |
| siła mleczności | G | **126** | niepożądany | > | pożądany | 0.69 | - | - |
| nogi-racice | G | **124** | niepożądane | > | pożądane | 0.69 | - | - |
| wymię | G | **135** | niepożądane | > | pożądane | 0.72 | - | - |
| budowa ogólna | G | **132** | niepożądana | > | pożądana | 0.73 | - | - |
| wysokość w krzyżu | G | **134** | niski | > | wysoki | 0.81 | - | - |
| głębokość tułowia | G | **92** | płytki | | głęboki | 0.77 | - | - |
| szerokość klatki piersiowej | G | **116** | wąska | | szeroka | 0.78 | - | - |
| ustawienie zadu | G | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | - | - |
| szerokość zadu | G | **132** | wąski | > | szeroki | 0.79 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | G | **86** | pionowa | | podsiebna | 0.76 | - | - |
| racice | G | **132** | długa przekątna | > | krótka przekątna | 0.72 | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | G | **125** | iksowate | > | równolegle | 0.71 | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | G | **127** | luźne | > | mocne | 0.78 | - | - |
| zawieszenie tylne wymienia | G | **125** | niskie | > | wysokie | 0.77 | - | - |
| więzadło środkowe wymienia | G | **104** | słabe | | mocne | 0.75 | - | - |
| położenie wymienia | G | **133** | niskie | > | wysokie | 0.80 | - | - |
| szerokość wymienia | G | **125** | wąskie | > | szerokie | 0.71 | - | - |
| ustawienie strzyków | G | **104** | szerokie | | wąskie | 0.80 | - | - |
| długość strzyków | G | **113** | krótkie | | długie | 0.81 | - | - |
| ustawienie strzyków - tył | G | **94** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.80 | - | - |
| charakter mleczny | G | **116** | ordynarny | | szlachetny | 0.78 | - | - |
| kondycja | G | **104** | słaba | | mocna | 0.80 | - | - |
| lokomocja | G | **120** | słaba | | dobra | 0.71 | - | - |
| struktura kostna | G | **99** | gruba | | płaska | 0.72 | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | G | **78** | < | | | 0.59 | - | - |
| temperament | G | **94** | | | | 0.48 | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | G | **97** | | | | 0.63 | - | - |
| przebieg porodu matczyny | G | **130** | | > | | 0.66 | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | G | **81** | | | | 0.61 | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | G | 133 | | > | | 0.71 | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | G | 113 | | | | 0.45 | - | - |