
# ISSOIRE OS
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM005693019697**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR5693019697**<br>NUMER | **1993-12-06**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **596** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-169** | 0.71 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **878** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **944** | 0.50 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **951** | 0.69 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **962** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1154** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-616** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-21.8** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.03** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.7** | 0.70 |
| % BIAŁKA | **0.08** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **96** | 0.78 |
| LICZBA OBÓR | **96** | 0.78 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **99** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.49 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **94** | 0.63 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.76 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **81** | 0.51 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | - | - | niepożądane | | pożądane | | - | - |
| wymię | MACE | **78** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 45 | 45 |
| budowa ogólna | - | - | niepożądana | | pożądana | | - | - |
| wysokość w krzyżu | MACE | **82** | niski | | wysoki | 0.81 | 45 | 45 |
| głębokość tułowia | MACE | **122** | płytki | | głęboki | 0.36 | 45 | 45 |
| szerokość klatki piersiowej | - | - | wąska | | szeroka | | - | - |
| ustawienie zadu | MACE | **95** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 45 | 45 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.38 | 45 | 45 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **93** | pionowa | | podsiebna | 0.63 | 45 | 45 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **89** | luźne | | mocne | 0.66 | 45 | 45 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **83** | niskie | | wysokie | 0.63 | 45 | 45 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **82** | słabe | | mocne | 0.55 | 45 | 45 |
| położenie wymienia | MACE | **79** | niskie | | wysokie | 0.77 | 45 | 45 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **94** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 45 | 45 |
| długość strzyków | MACE | **98** | krótkie | | długie | 0.72 | 45 | 45 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **83** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 45 | 45 |
| charakter mleczny | - | - | ordynarny | | szlachetny | | - | - |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **97** | | | | 0.33 | 45 | 45 |
| temperament | MACE | **102** | | | | 0.18 | 45 | 45 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.32 | 78 | 78 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **87** | | | | 0.39 | 21 | 21 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.24 | 64 | 64 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 101 | | | | 0.36 | 22 | 21 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |