# LIVARO BES
NAZWA

| | |
|---|---|
| **FRAM007295004869**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR7295004869**<br>NUMER | **1995-04-06**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **554** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-140** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **773** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **876** | 0.49 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **862** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **979** | 0.43 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1409** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-450** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-15.9** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.03** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-12.8** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.03** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **97** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **101** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **81** | 0.49 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **92** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **85** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **68** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.38 | 37 | 36 |
| wymię | MACE | **74** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 48 | 47 |
| budowa ogólna | MACE | **72** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 48 | 47 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **74** | niski | | wysoki | 0.81 | 48 | 47 |
| głębokość tułowia | MACE | **108** | płytki | | głęboki | 0.54 | 48 | 47 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **118** | wąska | | szeroka | 0.59 | 37 | 36 |
| ustawienie zadu | MACE | **92** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 48 | 47 |
| szerokość zadu | MACE | **113** | wąski | | szeroki | 0.69 | 48 | 47 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **97** | pionowa | | podsiebna | 0.62 | 48 | 47 |
| racice | - | - | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | - | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **70** | luźne | | mocne | 0.65 | 48 | 47 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.62 | 48 | 47 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **86** | słabe | | mocne | 0.54 | 48 | 47 |
| położenie wymienia | MACE | **64** | niskie | | wysokie | 0.76 | 48 | 47 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **74** | szerokie | | wąskie | 0.73 | 48 | 47 |
| długość strzyków | MACE | **122** | krótkie | | długie | 0.72 | 48 | 47 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **79** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 48 | 47 |
| charakter mleczny | MACE | **81** | ordynarny | | szlachetny | 0.46 | 37 | 36 |
| kondycja | - | - | słaba | | mocna | | - | - |
| lokomocja | MACE | **91** | słaba | | dobra | 0.37 | 37 | 36 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **81** | | | | 0.33 | 48 | 47 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.20 | 48 | 47 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **95** | | | | 0.33 | 99 | 99 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **96** | | | | 0.40 | 44 | 44 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **98** | | | | 0.24 | 82 | 82 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 105 | | | | 0.37 | 34 | 34 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |