
| REOC | |
|---|---|
| NAZWA | |
| **FRAM007627604443**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **FR7627604443**<br>NUMER | **2000-11-12**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **717** | 0.71 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **124** | 0.76 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **867** | 0.69 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1002** | 0.65 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1035** | 0.77 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1074** | 0.60 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **51** | 0.76 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **451** | 0.83 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **10.4** | 0.78 |
| % TŁUSZCZU | **-0.08** | 0.78 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **13.8** | 0.75 |
| % BIAŁKA | **-0.01** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **3153** | 0.83 |
| LICZBA OBÓR | **2154** | 0.83 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.56 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **106** | 0.67 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **106** | 0.79 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **93** | 0.59 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **83** | 0.86 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **90** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 843 | 602 |
| wymię | MACE | **105** | niepożądane | | pożądane | 0.71 | 843 | 602 |
| budowa ogólna | MACE | **97** | niepożądana | | pożądana | 0.72 | 843 | 602 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **91** | niski | | wysoki | 0.91 | 843 | 602 |
| głębokość tułowia | MACE | **93** | płytki | | głęboki | 0.78 | 843 | 602 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **84** | wąska | | szeroka | 0.83 | 843 | 602 |
| ustawienie zadu | MACE | **101** | uniesiony | | spadzisty | 0.87 | 843 | 602 |
| szerokość zadu | MACE | **92** | wąski | | szeroki | 0.88 | 843 | 602 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **92** | pionowa | | podsiebna | 0.85 | 843 | 602 |
| racice | MACE | **83** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.67 | 843 | 602 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **101** | iksowate | | równolegle | 0.74 | 843 | 602 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **101** | luźne | | mocne | 0.80 | 843 | 602 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **111** | niskie | | wysokie | 0.80 | 843 | 602 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **104** | słabe | | mocne | 0.74 | 843 | 602 |
| położenie wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.90 | 843 | 602 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **108** | szerokie | | wąskie | 0.89 | 843 | 602 |
| długość strzyków | MACE | **114** | krótkie | | długie | 0.88 | 843 | 602 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **113** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.91 | 843 | 602 |
| charakter mleczny | MACE | **99** | ordynarny | | szlachetny | 0.61 | 843 | 602 |
| kondycja | MACE | **99** | słaba | | mocna | 0.80 | 770 | 541 |
| lokomocja | MACE | **106** | słaba | | dobra | 0.58 | 830 | 595 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **111** | | | | 0.42 | 615 | 494 |
| temperament | MACE | **103** | | | | 0.28 | 615 | 494 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | 0.50 | 6955 | 4032 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **104** | | | | 0.58 | 4911 | 2016 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.48 | 6840 | 4032 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **120** | | | | 0.67 | 4794 | 2016 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |