
# NOREMEAD SUPREME RED
NAZWA

| | |
|---|---|
| **GBRM000000619502**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **UK619502**<br>NUMER | **2003-04-06**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **577** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-94** | 0.65 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **768** | 0.66 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **820** | 0.53 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **991** | 0.58 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1010** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1226** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-87** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-6.4** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **-0.03** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-11.4** | 0.63 |
| % BIAŁKA | **-0.09** | 0.63 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **371** | 0.69 |
| LICZBA OBÓR | **133** | 0.69 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **94** | 0.47 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **77** | 0.54 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **74** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **60** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.40 | 66 | 35 |
| wymię | MACE | **90** | niepożądane | | pożądane | 0.60 | 66 | 35 |
| budowa ogólna | MACE | **91** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 66 | 35 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **102** | niski | | wysoki | 0.80 | 66 | 35 |
| głębokość tułowia | MACE | **105** | płytki | | głęboki | 0.70 | 66 | 35 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **103** | wąska | | szeroka | 0.63 | 66 | 35 |
| ustawienie zadu | MACE | **86** | uniesiony | | spadzisty | 0.73 | 66 | 35 |
| szerokość zadu | MACE | **103** | wąski | | szeroki | 0.71 | 66 | 35 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **75** | pionowa | | podsiebna | 0.61 | 66 | 35 |
| racice | MACE | **109** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.53 | 66 | 35 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **90** | iksowate | | równolegle | 0.38 | 66 | 35 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **84** | luźne | | mocne | 0.69 | 66 | 35 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **102** | niskie | | wysokie | 0.63 | 66 | 35 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | mocne | 0.53 | 66 | 35 |
| położenie wymienia | MACE | **88** | niskie | | wysokie | 0.76 | 66 | 35 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **103** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 66 | 35 |
| długość strzyków | MACE | **90** | krótkie | | długie | 0.79 | 66 | 35 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **105** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 66 | 35 |
| charakter mleczny | MACE | **93** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 66 | 35 |
| kondycja | MACE | **104** | słaba | | mocna | 0.68 | 66 | 35 |
| lokomocja | MACE | **104** | słaba | | dobra | 0.36 | 66 | 35 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **105** | | | | 0.32 | 65 | 34 |
| temperament | MACE | **96** | | | | 0.21 | 66 | 35 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **85** | | | | 0.31 | 65 | 12 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |