
# BALLYCAIRN DONAIRO HERCULES
NAZWA

| GBRM000000650692 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **UK650692** | **2010-08-24** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **680** | 0.51 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-63** | 0.64 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1021** | 0.54 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **909** | 0.41 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1048** | 0.47 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1044** | 0.35 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **276** | 0.60 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **136** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-14.3** | 0.66 |
| % TŁUSZCZU | **-0.21** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-0.9** | 0.62 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.62 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **69** | 0.68 |
| LICZBA OBÓR | **57** | 0.68 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **102** | 0.38 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **81** | 0.42 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **117** | 0.65 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **88** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.32 | 24 | 20 |
| wymię | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 24 | 20 |
| budowa ogólna | MACE | **106** | niepożądana | | pożądana | 0.50 | 24 | 20 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **103** | niski | | wysoki | 0.69 | 24 | 20 |
| głębokość tułowia | MACE | **94** | płytki | | głęboki | 0.61 | 24 | 20 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **93** | wąska | | szeroka | 0.53 | 24 | 20 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.61 | 24 | 20 |
| szerokość zadu | MACE | **105** | wąski | | szeroki | 0.59 | 24 | 20 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **100** | pionowa | | podsiebna | 0.50 | 24 | 20 |
| racice | MACE | **92** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.42 | 24 | 20 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **107** | iksowate | | równolegle | 0.30 | 24 | 20 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **96** | luźne | | mocne | 0.55 | 24 | 20 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **108** | niskie | | wysokie | 0.52 | 24 | 20 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **99** | słabe | | mocne | 0.43 | 24 | 20 |
| położenie wymienia | MACE | **97** | niskie | | wysokie | 0.64 | 24 | 20 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **111** | szerokie | | wąskie | 0.63 | 24 | 20 |
| długość strzyków | MACE | **87** | krótkie | | długie | 0.66 | 24 | 20 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **106** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.59 | 24 | 20 |
| charakter mleczny | MACE | **96** | ordynarny | | szlachetny | 0.42 | 24 | 20 |
| kondycja | MACE | **92** | słaba | | mocna | 0.56 | 24 | 20 |
| lokomocja | MACE | **104** | słaba | | dobra | 0.29 | 24 | 20 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **87** | | | | 0.30 | 24 | 20 |
| temperament | MACE | **94** | | | | 0.20 | 24 | 20 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.24 | 53 | 26 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |