
# TYNEVALLEY BOMBARDIER
NAZWA

| GBRM000000662978 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **UK662978** | **2013-10-03** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **752** | 0.55 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **152** | 0.65 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **900** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1043** | 0.46 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1144** | 0.52 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1008** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-331** | 0.62 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-180** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **21.2** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **0.32** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **11.2** | 0.64 |
| % BIAŁKA | **0.19** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **86** | 0.69 |
| LICZBA OBÓR | **64** | 0.69 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **103** | 0.42 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **113** | 0.47 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **105** | 0.51 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **82** | 0.68 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **95** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **110** | niepożądane | | pożądane | 0.38 | 26 | 21 |
| wymię | MACE | **116** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 26 | 21 |
| budowa ogólna | MACE | **121** | niepożądana | | pożądana | 0.55 | 26 | 21 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **128** | niski | | wysoki | 0.73 | 26 | 21 |
| głębokość tułowia | MACE | **116** | płytki | | głęboki | 0.65 | 26 | 21 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **123** | wąska | | szeroka | 0.57 | 26 | 21 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.65 | 26 | 21 |
| szerokość zadu | MACE | **104** | wąski | | szeroki | 0.63 | 26 | 21 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **88** | pionowa | | podsiebna | 0.55 | 26 | 21 |
| racice | MACE | **118** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 26 | 21 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **105** | iksowate | | równolegle | 0.38 | 26 | 21 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **106** | luźne | | mocne | 0.59 | 26 | 21 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **123** | niskie | | wysokie | 0.57 | 26 | 21 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **108** | słabe | | mocne | 0.50 | 26 | 21 |
| położenie wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.67 | 26 | 21 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **94** | szerokie | | wąskie | 0.67 | 26 | 21 |
| długość strzyków | MACE | **114** | krótkie | | długie | 0.70 | 26 | 21 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **101** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.63 | 26 | 21 |
| charakter mleczny | MACE | **115** | ordynarny | | szlachetny | 0.48 | 26 | 21 |
| kondycja | MACE | **93** | słaba | | mocna | 0.60 | 26 | 21 |
| lokomocja | MACE | **113** | słaba | | dobra | 0.34 | 26 | 21 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **103** | | | | 0.30 | 26 | 21 |
| temperament | MACE | **92** | | | | 0.20 | 26 | 21 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **109** | | | | 0.32 | 80 | 30 |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |