# (IG) CACANODE HAROLD
NAZWA

| IRLM141806590662 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **IE141806590662** | **2008-02-03** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-11** | 0.57 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1142** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1196** | 0.34 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **949** | 0.54 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | - | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-46** | 0.59 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1353** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **19** | 0.58 |
| % TŁUSZCZU | **0.95** | 0.58 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-14.5** | 0.57 |
| % BIAŁKA | **0.4** | 0.57 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **4136** | 0.67 |
| LICZBA OBÓR | **1547** | 0.67 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **127** | 0.40 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **128** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **109** | 0.69 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **125** | 0.63 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.39 | 183 | 75 |
| wymię | MACE | **87** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 183 | 75 |
| budowa ogólna | MACE | **84** | niepożądana | | pożądana | 0.45 | 183 | 75 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **75** | niski | | wysoki | 0.80 | 183 | 75 |
| głębokość tułowia | MACE | **106** | płytki | | głęboki | 0.70 | 183 | 75 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **104** | wąska | | szeroka | 0.53 | 183 | 75 |
| ustawienie zadu | MACE | **121** | uniesiony | | spadzisty | 0.74 | 183 | 75 |
| szerokość zadu | MACE | **95** | wąski | | szeroki | 0.59 | 183 | 75 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **123** | pionowa | | podsiebna | 0.53 | 183 | 75 |
| racice | MACE | **65** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.47 | 183 | 75 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **116** | iksowate | | równolegle | 0.29 | 183 | 75 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **96** | luźne | | mocne | 0.62 | 183 | 75 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.63 | 183 | 75 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **101** | słabe | | mocne | 0.56 | 183 | 75 |
| położenie wymienia | MACE | **87** | niskie | | wysokie | 0.77 | 183 | 75 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **95** | szerokie | | wąskie | 0.77 | 183 | 75 |
| długość strzyków | MACE | **97** | krótkie | | długie | 0.82 | 183 | 75 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **99** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.72 | 183 | 75 |
| charakter mleczny | MACE | **79** | ordynarny | | szlachetny | 0.44 | 183 | 75 |
| kondycja | MACE | **119** | słaba | | mocna | 0.65 | 183 | 75 |
| lokomocja | MACE | **104** | słaba | | dobra | 0.30 | 183 | 75 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |