
# (IG) ALLENWOOD BUSTER
NAZWA

| | |
|---|---|
| **IRLM201009541003**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IE201009541003**<br>NUMER | **2013-11-08**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-74** | 0.58 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **930** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1093** | 0.36 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **950** | 0.48 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1275** | 0.59 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-817** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-6.3** | 0.59 |
| % TŁUSZCZU | **0.32** | 0.59 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.1** | 0.57 |
| % BIAŁKA | **0.23** | 0.57 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **1667** | 0.68 |
| LICZBA OBÓR | **678** | 0.68 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **115** | 0.41 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **113** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **75** | 0.70 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **109** | 0.62 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.35 | 41 | 23 |
| wymię | MACE | **69** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 41 | 23 |
| budowa ogólna | MACE | **78** | niepożądana | | pożądana | 0.41 | 41 | 23 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **87** | niski | | wysoki | 0.74 | 41 | 23 |
| głębokość tułowia | MACE | **90** | płytki | | głęboki | 0.63 | 41 | 23 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **90** | wąska | | szeroka | 0.48 | 41 | 23 |
| ustawienie zadu | MACE | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.68 | 41 | 23 |
| szerokość zadu | MACE | **91** | wąski | | szeroki | 0.54 | 41 | 23 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **77** | pionowa | | podsiebna | 0.45 | 41 | 23 |
| racice | MACE | **105** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.40 | 41 | 23 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **114** | iksowate | | równolegle | 0.26 | 41 | 23 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **89** | luźne | | mocne | 0.56 | 41 | 23 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **70** | niskie | | wysokie | 0.56 | 41 | 23 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **81** | słabe | | mocne | 0.50 | 41 | 23 |
| położenie wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.70 | 41 | 23 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **83** | szerokie | | wąskie | 0.69 | 41 | 23 |
| długość strzyków | MACE | **100** | krótkie | | długie | 0.75 | 41 | 23 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **79** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.65 | 41 | 23 |
| charakter mleczny | MACE | **85** | ordynarny | | szlachetny | 0.42 | 41 | 23 |
| kondycja | MACE | **101** | słaba | | mocna | 0.59 | 41 | 23 |
| lokomocja | MACE | **103** | słaba | | dobra | 0.27 | 41 | 23 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | - | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |