
# (IG) POSSEXTOWN KINDAR
NAZWA

| IRLM281565460737 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **IE281565460737** | **2011-02-14** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **-** | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-106** | 0.57 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1161** | 0.53 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1221** | 0.32 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **802** | 0.38 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **-** | - |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-475** | 0.56 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-939** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-7.1** | 0.58 |
| % TŁUSZCZU | **0.38** | 0.58 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13** | 0.56 |
| % BIAŁKA | **0.23** | 0.56 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **115** | 0.66 |
| LICZBA OBÓR | **80** | 0.66 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **-** | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **122** | 0.39 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **126** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **96** | 0.66 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **141** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | **-** | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | **-** | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **82** | niepożądane | | pożądane | 0.24 | 27 | 16 |
| wymię | MACE | **61** | niepożądane | | pożądane | 0.42 | 27 | 16 |
| budowa ogólna | MACE | **54** | niepożądana | | pożądana | 0.35 | 27 | 16 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **67** | niski | | wysoki | 0.68 | 27 | 16 |
| głębokość tułowia | MACE | **76** | płytki | | głęboki | 0.55 | 27 | 16 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **86** | wąska | | szeroka | 0.41 | 27 | 16 |
| ustawienie zadu | MACE | **103** | uniesiony | | spadzisty | 0.61 | 27 | 16 |
| szerokość zadu | MACE | **79** | wąski | | szeroki | 0.47 | 27 | 16 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **111** | pionowa | | podsiebna | 0.35 | 27 | 16 |
| racice | - | **-** | długa przekątna | | krótka przekątna | | - | - |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | - | **-** | iksowate | | równolegle | | - | - |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **85** | luźne | | mocne | 0.50 | 27 | 16 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **68** | niskie | | wysokie | 0.49 | 27 | 16 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **61** | słabe | | mocne | 0.41 | 27 | 16 |
| położenie wymienia | MACE | **86** | niskie | | wysokie | 0.59 | 27 | 16 |
| szerokość wymienia | - | **-** | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **60** | szerokie | | wąskie | 0.61 | 27 | 16 |
| długość strzyków | MACE | **114** | krótkie | | długie | 0.64 | 27 | 16 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **61** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.58 | 27 | 16 |
| charakter mleczny | MACE | **58** | ordynarny | | szlachetny | 0.33 | 27 | 16 |
| kondycja | MACE | **120** | słaba | | mocna | 0.53 | 27 | 16 |
| lokomocja | - | **-** | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | **-** | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | **-** | | | | | - | - |
| temperament | - | **-** | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | **-** | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | - | **-** | | | | | - | - |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | - | - | | | | | - | - |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |