
# CESAR SOUTHWIND BAXTER
NAZWA

| ITAM000906040557 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **IT000906040557** | **1990-10-03** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | - | - |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-193** | 0.58 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **833** | 0.55 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | - | - |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **918** | 0.57 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **989** | 0.41 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | - | - |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-433** | 0.61 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-18** | 0.62 |
| % TŁUSZCZU | **-0.01** | 0.62 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-20.2** | 0.56 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.56 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **21** | 0.61 |
| LICZBA OBÓR | **15** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | - | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | - | - |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | - | - |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **87** | 0.61 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **77** | 0.65 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **111** | niepożądane | | pożądane | 0.45 | 17 | 11 |
| wymię | MACE | **70** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 17 | 11 |
| budowa ogólna | MACE | **82** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 17 | 11 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **87** | niski | | wysoki | 0.74 | 17 | 11 |
| głębokość tułowia | MACE | **105** | płytki | | głęboki | 0.60 | 17 | 11 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **104** | wąska | | szeroka | 0.60 | 17 | 11 |
| ustawienie zadu | MACE | **100** | uniesiony | | spadzisty | 0.69 | 17 | 11 |
| szerokość zadu | MACE | **93** | wąski | | szeroki | 0.65 | 17 | 11 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **82** | pionowa | | podsiebna | 0.61 | 17 | 11 |
| racice | MACE | **100** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.52 | 17 | 11 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **106** | iksowate | | równolegle | 0.47 | 17 | 11 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **81** | luźne | | mocne | 0.62 | 17 | 11 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **73** | niskie | | wysokie | 0.61 | 17 | 11 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **85** | słabe | | mocne | 0.51 | 17 | 11 |
| położenie wymienia | MACE | **76** | niskie | | wysokie | 0.73 | 17 | 11 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **85** | szerokie | | wąskie | 0.63 | 17 | 11 |
| długość strzyków | MACE | **96** | krótkie | | długie | 0.70 | 17 | 11 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **102** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.68 | 17 | 11 |
| charakter mleczny | MACE | **82** | ordynarny | | szlachetny | 0.60 | 17 | 11 |
| kondycja | MACE | **119** | słaba | | mocna | 0.59 | 15 | 10 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.32 | 2723 | 783 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **81** | | | | 0.36 | 2316 | 613 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.36 | 3082 | 818 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 96 | | | | 0.48 | 2475 | 624 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |