
# BEL BAXTER PINTAS ET TV TL

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM001990270929**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT001990270929**<br>NUMER | **2008-10-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **632** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-138** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **943** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **895** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1009** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1074** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-732** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **275** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-10.9** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.23** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-15.7** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.27** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **105** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **69** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **117** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **95** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **79** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **82** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **94** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **100** | niepożądane | | pożądane | 0.53 | 92 | 64 |
| wymię | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 92 | 64 |
| budowa ogólna | MACE | **109** | niepożądana | | pożądana | 0.64 | 92 | 64 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **109** | niski | | wysoki | 0.81 | 92 | 64 |
| głębokość tułowia | MACE | **136** | płytki | | głęboki | 0.66 | 92 | 64 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **127** | wąska | | szeroka | 0.67 | 92 | 64 |
| ustawienie zadu | MACE | **102** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 92 | 64 |
| szerokość zadu | MACE | **113** | wąski | | szeroki | 0.75 | 92 | 64 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **110** | pionowa | | podsiebna | 0.71 | 92 | 64 |
| racice | MACE | **100** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.62 | 92 | 64 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **92** | iksowate | | równolegle | 0.56 | 92 | 64 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **90** | luźne | | mocne | 0.70 | 92 | 64 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.70 | 92 | 64 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **118** | słabe | | mocne | 0.58 | 92 | 64 |
| położenie wymienia | MACE | **80** | niskie | | wysokie | 0.81 | 92 | 64 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **88** | szerokie | | wąskie | 0.71 | 92 | 64 |
| długość strzyków | MACE | **116** | krótkie | | długie | 0.77 | 92 | 64 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **105** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.76 | 92 | 64 |
| charakter mleczny | MACE | **115** | ordynarny | | szlachetny | 0.68 | 92 | 64 |
| kondycja | MACE | **97** | słaba | | mocna | 0.71 | 83 | 56 |
| lokomocja | MACE | **101** | słaba | | dobra | 0.46 | 85 | 58 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **96** | | | | 0.43 | 76 | 47 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.32 | 76 | 47 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.38 | 171 | 78 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **109** | | | | 0.35 | 133 | 46 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **90** | | | | 0.40 | 237 | 99 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **119** | | | | 0.43 | 192 | 59 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |