
# BERSAGLIO MODEST RINOA ET TL
NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM017990338939**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT017990338939**<br>NUMER | **2006-01-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **585** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-139** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **859** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **831** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **949** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1033** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1077** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **85** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-22.9** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.29** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-7.9** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **118** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **76** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **76** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **88** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **83** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **88** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **80** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **85** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 104 | 63 |
| wymię | MACE | **88** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 104 | 63 |
| budowa ogólna | MACE | **91** | niepożądana | | pożądana | 0.65 | 104 | 63 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **98** | niski | | wysoki | 0.82 | 104 | 63 |
| głębokość tułowia | MACE | **100** | płytki | | głęboki | 0.67 | 104 | 63 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **93** | wąska | | szeroka | 0.68 | 104 | 63 |
| ustawienie zadu | MACE | **87** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 104 | 63 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | szeroki | 0.76 | 104 | 63 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **122** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 104 | 63 |
| racice | MACE | **83** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.64 | 104 | 63 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **86** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 104 | 63 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **94** | luźne | | mocne | 0.71 | 104 | 63 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **99** | niskie | | wysokie | 0.71 | 104 | 63 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **101** | słabe | | mocne | 0.60 | 104 | 63 |
| położenie wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.82 | 104 | 63 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **75** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 104 | 63 |
| długość strzyków | MACE | **120** | krótkie | | długie | 0.78 | 104 | 63 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **104** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 104 | 63 |
| charakter mleczny | MACE | **108** | ordynarny | | szlachetny | 0.69 | 104 | 63 |
| kondycja | MACE | **86** | słaba | | mocna | 0.72 | 98 | 59 |
| lokomocja | MACE | **95** | słaba | | dobra | 0.46 | 94 | 57 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **101** | | | | 0.43 | 86 | 51 |
| temperament | MACE | **92** | | | | 0.29 | 86 | 51 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.34 | 161 | 76 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **105** | | | | 0.35 | 168 | 53 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **88** | | | | 0.38 | 252 | 109 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 108 | | | | 0.45 | 251 | 66 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |