
# CIOLIFARM LOU ROB ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM017990566060**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT017990566060**<br>NUMER | **2007-10-10**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **600** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-261** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **936** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **881** | 0.56 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1093** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1045** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1279** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-316** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-30.6** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.21** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-23.1** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.14** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **107** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **80** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **103** | 0.31 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **82** | 0.52 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **92** | 0.60 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **89** | 0.62 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **99** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **88** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.51 | 81 | 59 |
| wymię | MACE | **112** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 81 | 59 |
| budowa ogólna | MACE | **115** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 81 | 59 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **121** | niski | | wysoki | 0.81 | 81 | 59 |
| głębokość tułowia | MACE | **112** | płytki | | głęboki | 0.66 | 81 | 59 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **105** | wąska | | szeroka | 0.66 | 81 | 59 |
| ustawienie zadu | MACE | **108** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 81 | 59 |
| szerokość zadu | MACE | **100** | wąski | | szeroki | 0.74 | 81 | 59 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **107** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 81 | 59 |
| racice | MACE | **100** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.61 | 81 | 59 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 81 | 59 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **104** | luźne | | mocne | 0.69 | 81 | 59 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **115** | niskie | | wysokie | 0.69 | 81 | 59 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **128** | słabe | | mocne | 0.58 | 81 | 59 |
| położenie wymienia | MACE | **110** | niskie | | wysokie | 0.80 | 81 | 59 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **105** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 81 | 59 |
| długość strzyków | MACE | **105** | krótkie | | długie | 0.77 | 81 | 59 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **111** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 81 | 59 |
| charakter mleczny | MACE | **122** | ordynarny | | szlachetny | 0.67 | 81 | 59 |
| kondycja | MACE | **85** | słaba | | mocna | 0.69 | 70 | 53 |
| lokomocja | MACE | **96** | słaba | | dobra | 0.43 | 73 | 53 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **100** | | | | 0.39 | 54 | 42 |
| temperament | MACE | **86** | | | | 0.23 | 54 | 42 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.34 | 191 | 104 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **105** | | | | 0.33 | 130 | 52 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **88** | | | | 0.36 | 246 | 124 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 102 | | | | 0.42 | 187 | 64 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |