
# BARBISELLE DONOR NARO ET TV

NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM019500298186**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT019500298186**<br>NUMER | **2002-09-23**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **700** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **75** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1006** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **995** | 0.52 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **878** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **955** | 0.41 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **907** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **735** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **0.4** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.3** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **12.2** | 0.64 |
| % BIAŁKA | **-0.13** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **80** | 0.70 |
| LICZBA OBÓR | **43** | 0.70 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **-** | - |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **97** | 0.48 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **100** | 0.57 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.58 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **111** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **92** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | 68 | niepożądane | | pożądane | 0.42 | 27 | 19 |
| wymię | MACE | 84 | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 27 | 19 |
| budowa ogólna | MACE | 78 | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 27 | 19 |
| wysokość w krzyżu | MACE | 82 | niski | | wysoki | 0.75 | 27 | 19 |
| głębokość tułowia | MACE | 90 | płytki | | głęboki | 0.60 | 27 | 19 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | 87 | wąska | | szeroka | 0.60 | 27 | 19 |
| ustawienie zadu | MACE | 100 | uniesiony | | spadzisty | 0.70 | 27 | 19 |
| szerokość zadu | MACE | 90 | wąski | | szeroki | 0.66 | 27 | 19 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | 120 | pionowa | | podsiebna | 0.61 | 27 | 19 |
| racice | MACE | 77 | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.51 | 27 | 19 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | 79 | iksowate | | równolegle | 0.46 | 27 | 19 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | 90 | luźne | | mocne | 0.62 | 27 | 19 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | 79 | niskie | | wysokie | 0.61 | 27 | 19 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | 76 | słabe | | mocne | 0.50 | 27 | 19 |
| położenie wymienia | MACE | 92 | niskie | | wysokie | 0.73 | 27 | 19 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | 96 | szerokie | | wąskie | 0.64 | 27 | 19 |
| długość strzyków | MACE | 89 | krótkie | | długie | 0.70 | 27 | 19 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | 95 | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.69 | 27 | 19 |
| charakter mleczny | MACE | 89 | ordynarny | | szlachetny | 0.59 | 27 | 19 |
| kondycja | MACE | 94 | słaba | | mocna | 0.61 | 27 | 19 |
| lokomocja | MACE | 75 | słaba | | dobra | 0.33 | 21 | 14 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | 106 | | | | 0.32 | 58 | 30 |
| temperament | MACE | 101 | | | | 0.12 | 58 | 30 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | 84 | | | | 0.28 | 158 | 54 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 82 | | | | 0.40 | 238 | 41 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |