
# ARIMO ET
NAZWA

| ITAM019990400604 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| IT019990400604 | 2006-11-15 |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **695** | 0.62 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **112** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **880** | 0.59 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **882** | 0.58 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1054** | 0.65 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1068** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **360** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **20.5** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.06** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **5** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **121** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **76** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **96** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **86** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **89** | 0.62 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **88** | 0.64 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **93** | 0.78 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **80** | 0.55 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **103** | niepożądane | | | | pożądane | 0.54 | 109 | 67 |
| wymię | MACE | **93** | niepożądane | | | | pożądane | 0.65 | 109 | 67 |
| budowa ogólna | MACE | **106** | niepożądana | | | | pożądana | 0.64 | 109 | 67 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **101** | niski | | | | wysoki | 0.82 | 109 | 67 |
| głębokość tułowia | MACE | **109** | płytki | | | | głęboki | 0.66 | 109 | 67 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **108** | wąska | | | | szeroka | 0.67 | 109 | 67 |
| ustawienie zadu | MACE | **104** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.80 | 109 | 67 |
| szerokość zadu | MACE | **105** | wąski | | | | szeroki | 0.75 | 109 | 67 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **104** | pionowa | | | | podsiebna | 0.72 | 109 | 67 |
| racice | MACE | **106** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.63 | 109 | 67 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **105** | iksowate | | | | równolegle | 0.57 | 109 | 67 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **96** | luźne | | | | mocne | 0.70 | 109 | 67 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **108** | niskie | | | | wysokie | 0.70 | 109 | 67 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **109** | słabe | | | | mocne | 0.59 | 109 | 67 |
| położenie wymienia | MACE | **85** | niskie | | | | wysokie | 0.82 | 109 | 67 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **105** | szerokie | | | | wąskie | 0.71 | 109 | 67 |
| długość strzyków | MACE | **89** | krótkie | | | | długie | 0.78 | 109 | 67 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **107** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.77 | 109 | 67 |
| charakter mleczny | MACE | **110** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.69 | 109 | 67 |
| kondycja | MACE | **112** | słaba | | | | mocna | 0.72 | 102 | 63 |
| lokomocja | MACE | **105** | słaba | | | | dobra | 0.46 | 102 | 61 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | | | 0.42 | 54 | 38 |
| temperament | MACE | **97** | | | | | | 0.31 | 54 | 38 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **102** | | | | | | 0.36 | 209 | 99 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **98** | | | | | | 0.34 | 153 | 49 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **99** | | | | | | 0.38 | 253 | 116 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 101 | | | | 0.43 | 222 | 61 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |