
# ALFRAG SCOOBYDUU BRUGAL
NAZWA

| ITAM019990662498 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **IT019990662498** | **2009-10-29** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **636** | 0.57 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-197** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **917** | 0.56 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1012** | 0.49 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1060** | 0.60 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1041** | 0.44 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-917** | 0.65 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-552** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-23** | 0.71 |
| % TŁUSZCZU | **-0.01** | 0.71 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-17.5** | 0.64 |
| % BIAŁKA | **0.01** | 0.64 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **91** | 0.71 |
| LICZBA OBÓR | **68** | 0.71 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **106** | 0.27 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **100** | 0.46 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **107** | 0.53 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **101** | 0.54 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **100** | 0.75 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **82** | 0.52 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.47 | 65 | 49 |
| wymię | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 65 | 49 |
| budowa ogólna | MACE | **104** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 65 | 49 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **103** | niski | | wysoki | 0.79 | 65 | 49 |
| głębokość tułowia | MACE | **96** | płytki | | głęboki | 0.63 | 65 | 49 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **95** | wąska | | szeroka | 0.64 | 65 | 49 |
| ustawienie zadu | MACE | **92** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 65 | 49 |
| szerokość zadu | MACE | **93** | wąski | | szeroki | 0.71 | 65 | 49 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **93** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 65 | 49 |
| racice | MACE | **94** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.57 | 65 | 49 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **100** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 65 | 49 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **105** | luźne | | mocne | 0.67 | 65 | 49 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.66 | 65 | 49 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **106** | słabe | | mocne | 0.55 | 65 | 49 |
| położenie wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.78 | 65 | 49 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **111** | szerokie | | wąskie | 0.68 | 65 | 49 |
| długość strzyków | MACE | **106** | krótkie | | długie | 0.75 | 65 | 49 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **107** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.73 | 65 | 49 |
| charakter mleczny | MACE | **111** | ordynarny | | szlachetny | 0.64 | 65 | 49 |
| kondycja | MACE | **91** | słaba | | mocna | 0.66 | 57 | 43 |
| lokomocja | MACE | **105** | słaba | | dobra | 0.38 | 55 | 43 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **90** | | | | 0.34 | 49 | 33 |
| temperament | MACE | **94** | | | | 0.15 | 49 | 33 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | - | - | | | | | - | - |
| przebieg porodu matczyny | - | - | | | | | - | - |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **101** | | | | 0.32 | 213 | 116 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 102 | | | | 0.37 | 130 | 52 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |