
# GO-FARM SAFFRON ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **ITAM019991671515**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **IT019991671515**<br>NUMER | **2017-08-17**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **815** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **268** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1022** | 0.57 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1030** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1121** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1051** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1243** | 0.68 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **424** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **21.1** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **0.04** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **30.6** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **0.17** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **142** | 0.73 |
| LICZBA OBÓR | **70** | 0.73 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **112** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.53 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **117** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **105** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **108** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **96** | 0.50 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **104** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 89 | 50 |
| wymię | MACE | **124** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 89 | 50 |
| budowa ogólna | MACE | **121** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 89 | 50 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **127** | niski | | wysoki | 0.81 | 89 | 50 |
| głębokość tułowia | MACE | **114** | płytki | | głęboki | 0.66 | 89 | 50 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **120** | wąska | | szeroka | 0.66 | 89 | 50 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 89 | 50 |
| szerokość zadu | MACE | **112** | wąski | | szeroki | 0.74 | 89 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **87** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 89 | 50 |
| racice | MACE | **113** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.61 | 89 | 50 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **99** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 89 | 50 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **110** | luźne | | mocne | 0.69 | 89 | 50 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **123** | niskie | | wysokie | 0.69 | 89 | 50 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **100** | słabe | | mocne | 0.58 | 89 | 50 |
| położenie wymienia | MACE | **108** | niskie | | wysokie | 0.80 | 89 | 50 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **112** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 89 | 50 |
| długość strzyków | MACE | **92** | krótkie | | długie | 0.77 | 89 | 50 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **105** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 89 | 50 |
| charakter mleczny | MACE | **116** | ordynarny | | szlachetny | 0.67 | 89 | 50 |
| kondycja | MACE | **100** | słaba | | mocna | 0.69 | 75 | 42 |
| lokomocja | MACE | **102** | słaba | | dobra | 0.44 | 77 | 43 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **106** | | | | 0.43 | 86 | 44 |
| temperament | MACE | **90** | | | | 0.30 | 86 | 44 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **110** | | | | 0.37 | 203 | 56 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **104** | | | | 0.33 | 121 | 38 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **78** | | | | 0.39 | 356 | 94 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 112 | | | | 0.42 | 193 | 53 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |