
# BOSCHINI ALEXANDER
NAZWA

| ITAM020500264784 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **IT020500264784** | **2003-08-28** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **621** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-99** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **885** | 0.61 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **840** | 0.60 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1026** | 0.66 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1073** | 0.52 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-933** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-1** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-7.5** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.08** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-11.6** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.13** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **185** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **104** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.55 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **72** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **77** | 0.66 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **91** | 0.80 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **85** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **91** | niepożądane | | pożądane | 0.54 | 132 | 72 |
| wymię | MACE | **105** | niepożądane | | pożądane | 0.65 | 132 | 72 |
| budowa ogólna | MACE | **105** | niepożądana | | pożądana | 0.65 | 132 | 72 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **101** | niski | | wysoki | 0.83 | 132 | 72 |
| głębokość tułowia | MACE | **100** | płytki | | głęboki | 0.67 | 132 | 72 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.68 | 132 | 72 |
| ustawienie zadu | MACE | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.81 | 132 | 72 |
| szerokość zadu | MACE | **108** | wąski | | szeroki | 0.76 | 132 | 72 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **112** | pionowa | | podsiebna | 0.73 | 132 | 72 |
| racice | MACE | **105** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.65 | 132 | 72 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **89** | iksowate | | równolegle | 0.58 | 132 | 72 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **106** | luźne | | mocne | 0.71 | 132 | 72 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **101** | niskie | | wysokie | 0.71 | 132 | 72 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **111** | słabe | | mocne | 0.59 | 132 | 72 |
| położenie wymienia | MACE | **103** | niskie | | wysokie | 0.83 | 132 | 72 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **122** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 132 | 72 |
| długość strzyków | MACE | **81** | krótkie | | długie | 0.79 | 132 | 72 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **114** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 132 | 72 |
| charakter mleczny | MACE | **105** | ordynarny | | szlachetny | 0.69 | 132 | 72 |
| kondycja | MACE | **96** | słaba | | mocna | 0.73 | 121 | 71 |
| lokomocja | MACE | **93** | słaba | | dobra | 0.47 | 94 | 52 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **107** | | | | 0.43 | 116 | 60 |
| temperament | MACE | **100** | | | | 0.31 | 116 | 60 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.37 | 340 | 117 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **90** | | | | 0.35 | 262 | 74 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **115** | | | | 0.39 | 445 | 146 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 98 | | | | 0.45 | 354 | 87 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |