
# LA BAGOLINA JARDIN JANOX
NAZWA

| ITAM024990219320 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **IT024990219320** | **2008-02-08** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **658** | 0.60 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **60** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **811** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **891** | 0.54 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1006** | 0.63 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1081** | 0.50 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1016** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-12** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **2.9** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **0.04** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **8.1** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **0.09** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **109** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **73** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **102** | 0.31 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **92** | 0.51 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **84** | 0.59 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **86** | 0.60 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **72** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **87** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **101** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 89 | 60 |
| wymię | MACE | **99** | niepożądane | | pożądane | 0.63 | 89 | 60 |
| budowa ogólna | MACE | **98** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 89 | 60 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **108** | niski | | wysoki | 0.81 | 89 | 60 |
| głębokość tułowia | MACE | **95** | płytki | | głęboki | 0.65 | 89 | 60 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **99** | wąska | | szeroka | 0.66 | 89 | 60 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 89 | 60 |
| szerokość zadu | MACE | **110** | wąski | | szeroki | 0.74 | 89 | 60 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **87** | pionowa | | podsiebna | 0.69 | 89 | 60 |
| racice | MACE | **89** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.60 | 89 | 60 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **99** | iksowate | | równolegle | 0.54 | 89 | 60 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **87** | luźne | | mocne | 0.69 | 89 | 60 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **109** | niskie | | wysokie | 0.69 | 89 | 60 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **119** | słabe | | mocne | 0.57 | 89 | 60 |
| położenie wymienia | MACE | **96** | niskie | | wysokie | 0.80 | 89 | 60 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **106** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 89 | 60 |
| długość strzyków | MACE | **93** | krótkie | | długie | 0.77 | 89 | 60 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **133** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 89 | 60 |
| charakter mleczny | MACE | **100** | ordynarny | | szlachetny | 0.67 | 89 | 60 |
| kondycja | MACE | **100** | słaba | | mocna | 0.69 | 79 | 55 |
| lokomocja | MACE | **101** | słaba | | dobra | 0.43 | 78 | 51 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **113** | | | | 0.42 | 68 | 38 |
| temperament | MACE | **109** | | | | 0.30 | 68 | 38 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **100** | | | | 0.32 | 199 | 77 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **99** | | | | 0.31 | 110 | 42 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.36 | 237 | 85 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 110 | | | | 0.41 | 177 | 52 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |