
# ALBY CANVAS RUMBLE R ET
NAZWA

| ITAM024990245224 | RW |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| IT024990245224 | 2008-10-25 |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **731** | 0.63 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **174** | 0.70 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **988** | 0.60 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **869** | 0.59 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1062** | 0.67 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **983** | 0.53 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **768** | 0.69 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **848** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **18.3** | 0.73 |
| % TŁUSZCZU | **-0.16** | 0.73 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **16.7** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **-0.12** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **147** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **88** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **110** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **90** | 0.56 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **79** | 0.64 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **81** | 0.65 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **98** | 0.79 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **100** | 0.58 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **120** | niepożądane | | | | pożądane | 0.55 | 114 | 72 |
| wymię | MACE | **91** | niepożądane | | | | pożądane | 0.66 | 114 | 72 |
| budowa ogólna | MACE | **97** | niepożądana | | | | pożądana | 0.66 | 114 | 72 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **95** | niski | | | | wysoki | 0.83 | 114 | 72 |
| głębokość tułowia | MACE | **90** | płytki | | | | głęboki | 0.68 | 114 | 72 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **82** | wąska | | | | szeroka | 0.68 | 114 | 72 |
| ustawienie zadu | MACE | **124** | uniesiony | | | | spadzisty | 0.81 | 114 | 72 |
| szerokość zadu | MACE | **90** | wąski | | | | szeroki | 0.76 | 114 | 72 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **99** | pionowa | | | | podsiebna | 0.73 | 114 | 72 |
| racice | MACE | **110** | długa przekątna | | | | krótka przekątna | 0.65 | 114 | 72 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **118** | iksowate | | | | równolegle | 0.59 | 114 | 72 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **95** | luźne | | | | mocne | 0.71 | 114 | 72 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **92** | niskie | | | | wysokie | 0.72 | 114 | 72 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **90** | słabe | | | | mocne | 0.60 | 114 | 72 |
| położenie wymienia | MACE | **98** | niskie | | | | wysokie | 0.83 | 114 | 72 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **102** | szerokie | | | | wąskie | 0.72 | 114 | 72 |
| długość strzyków | MACE | **118** | krótkie | | | | długie | 0.79 | 114 | 72 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **119** | zewnętrzne | | | | wewnętrzne | 0.78 | 114 | 72 |
| charakter mleczny | MACE | **93** | ordynarny | | | | szlachetny | 0.70 | 114 | 72 |
| kondycja | MACE | **97** | słaba | | | | mocna | 0.73 | 105 | 67 |
| lokomocja | MACE | **123** | słaba | | | | dobra | 0.48 | 101 | 65 |
| struktura kostna | - | - | słaba | | | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **110** | | | | | | 0.44 | 86 | 53 |
| temperament | MACE | **99** | | | | | | 0.32 | 86 | 53 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | | 100 | | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **110** | | | | | | 0.39 | 231 | 91 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **79** | | | | | | 0.35 | 139 | 47 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **108** | | | | | | 0.41 | 284 | 106 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 79 | < | | | 0.45 | 237 | 66 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |