
# CHEMELLO ROYAL TINDALL ET

NAZWA

| ITAM024990255700 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| IT024990255700 | 2010-08-29 |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **712** | 0.61 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-202** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1071** | 0.58 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1205** | 0.57 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1090** | 0.64 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1005** | 0.51 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-406** | 0.67 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-56** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-30.4** | 0.72 |
| % TŁUSZCZU | **-0.31** | 0.72 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-13.4** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.13** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **107** | 0.72 |
| LICZBA OBÓR | **80** | 0.72 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **107** | 0.35 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **133** | 0.54 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **106** | 0.61 |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **116** | 0.63 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **94** | 0.77 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **123** | 0.54 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.52 | 82 | 60 |
| wymię | MACE | **115** | niepożądane | | pożądane | 0.64 | 82 | 60 |
| budowa ogólna | MACE | **98** | niepożądana | | pożądana | 0.63 | 82 | 60 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **102** | niski | | wysoki | 0.81 | 82 | 60 |
| głębokość tułowia | MACE | **75** | płytki | | głęboki | 0.66 | 82 | 60 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **74** | wąska | | szeroka | 0.66 | 82 | 60 |
| ustawienie zadu | MACE | **107** | uniesiony | | spadzisty | 0.78 | 82 | 60 |
| szerokość zadu | MACE | **89** | wąski | | szeroki | 0.74 | 82 | 60 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **112** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 82 | 60 |
| racice | MACE | **111** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.61 | 82 | 60 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **92** | iksowate | | równolegle | 0.55 | 82 | 60 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **106** | luźne | | mocne | 0.69 | 82 | 60 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **106** | niskie | | wysokie | 0.69 | 82 | 60 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **111** | słabe | | mocne | 0.58 | 82 | 60 |
| położenie wymienia | MACE | **121** | niskie | | wysokie | 0.80 | 82 | 60 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **106** | szerokie | | wąskie | 0.70 | 82 | 60 |
| długość strzyków | MACE | **92** | krótkie | | długie | 0.77 | 82 | 60 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **109** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 82 | 60 |
| charakter mleczny | MACE | **96** | ordynarny | | szlachetny | 0.67 | 82 | 60 |
| kondycja | MACE | **87** | słaba | | mocna | 0.70 | 78 | 58 |
| lokomocja | MACE | **94** | słaba | | dobra | 0.44 | 73 | 54 |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.42 | 65 | 47 |
| temperament | MACE | **110** | | | | 0.31 | 65 | 47 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.37 | 181 | 82 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **91** | | | | 0.34 | 108 | 41 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.39 | 237 | 105 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **100** | | | | 0.43 | 192 | 60 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |