
# SUMICKLAND NEW ATOM ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000053069**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000053069**<br>NUMER | **2003-09-28**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **654** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **16** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **859** | 0.52 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **866** | 0.43 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1023** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1077** | 0.42 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-656** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-16** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **16.4** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **0.19** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-8.2** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **62** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **47** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **111** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **89** | 0.41 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **80** | 0.47 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **89** | 0.58 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **81** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.50 | 55 | 42 |
| wymię | MACE | **96** | niepożądane | | pożądane | 0.61 | 55 | 42 |
| budowa ogólna | MACE | **100** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 55 | 42 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **98** | niski | | wysoki | 0.83 | 55 | 42 |
| głębokość tułowia | MACE | **111** | płytki | | głęboki | 0.64 | 55 | 42 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **107** | wąska | | szeroka | 0.61 | 55 | 42 |
| ustawienie zadu | MACE | **97** | uniesiony | | spadzisty | 0.79 | 55 | 42 |
| szerokość zadu | MACE | **98** | wąski | | szeroki | 0.78 | 55 | 42 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **108** | pionowa | | podsiebna | 0.70 | 55 | 42 |
| racice | MACE | **105** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.46 | 55 | 42 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **103** | iksowate | | równolegle | 0.53 | 55 | 42 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **91** | luźne | | mocne | 0.65 | 55 | 42 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **98** | niskie | | wysokie | 0.67 | 55 | 42 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **97** | słabe | | mocne | 0.56 | 55 | 42 |
| położenie wymienia | MACE | **85** | niskie | | wysokie | 0.81 | 55 | 42 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **100** | szerokie | | wąskie | 0.76 | 55 | 42 |
| długość strzyków | MACE | **81** | krótkie | | długie | 0.84 | 55 | 42 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **102** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.77 | 55 | 42 |
| charakter mleczny | MACE | **111** | ordynarny | | szlachetny | 0.57 | 55 | 42 |
| kondycja | MACE | **90** | słaba | | mocna | 0.69 | 55 | 42 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | - | - | | | | | - | - |
| temperament | - | - | | | | | - | - |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **92** | | | | 0.34 | 97 | 73 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **109** | | | | 0.35 | 134 | 42 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.33 | 112 | 84 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 110 | | | | 0.48 | 144 | 45 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |