
# KENEKA-LAND PRONTO FREILLA ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000054808**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000054808**<br>NUMER | **2008-06-12**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **661** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-107** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **895** | 0.53 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **992** | 0.43 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1106** | 0.61 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1048** | 0.46 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-1080** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **-184** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-9** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.02** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-11.8** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **-0.06** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **64** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **60** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **105** | 0.30 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.42 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **100** | 0.48 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **76** | 0.59 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **101** | 0.61 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **134** | niepożądane | > | pożądane | 0.49 | 57 | 53 |
| wymię | MACE | **107** | niepożądane | | pożądane | 0.62 | 57 | 53 |
| budowa ogólna | MACE | **119** | niepożądana | | pożądana | 0.62 | 57 | 53 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **104** | niski | | wysoki | 0.83 | 57 | 53 |
| głębokość tułowia | MACE | **107** | płytki | | głęboki | 0.64 | 57 | 53 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **97** | wąska | | szeroka | 0.62 | 57 | 53 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.80 | 57 | 53 |
| szerokość zadu | MACE | **101** | wąski | | szeroki | 0.79 | 57 | 53 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **82** | pionowa | | podsiebna | 0.72 | 57 | 53 |
| racice | MACE | **122** | długa przekątna | > | krótka przekątna | 0.46 | 57 | 53 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **126** | iksowate | > | równolegle | 0.53 | 57 | 53 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **100** | luźne | | mocne | 0.66 | 57 | 53 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.67 | 57 | 53 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **96** | słabe | | mocne | 0.57 | 57 | 53 |
| położenie wymienia | MACE | **104** | niskie | | wysokie | 0.82 | 57 | 53 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **96** | szerokie | | wąskie | 0.78 | 57 | 53 |
| długość strzyków | MACE | **90** | krótkie | | długie | 0.85 | 57 | 53 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **94** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.79 | 57 | 53 |
| charakter mleczny | MACE | **107** | ordynarny | | szlachetny | 0.57 | 57 | 53 |
| kondycja | MACE | **99** | słaba | | mocna | 0.70 | 57 | 53 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **102** | | | | 0.31 | 55 | 51 |
| temperament | MACE | **97** | | | | 0.19 | 55 | 51 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **97** | | | | 0.30 | 105 | 81 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **93** | | | | 0.34 | 136 | 47 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **105** | | | | 0.29 | 118 | 91 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 87 | | | | 0.48 | 156 | 53 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |