
# OMURA SWEETY RAPOLE ET
NAZWA

| JPNM000000055333 | HO |
|---|---|
| NUMER MIĘDZ. | RASA |
| **JP000000055333** | **2009-10-20** |
| NUMER | DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **609** | 0.51 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-68** | 0.65 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **808** | 0.48 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **853** | 0.36 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1007** | 0.55 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1060** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-778** | 0.59 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **197** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-15.3** | 0.66 |
| % TŁUSZCZU | **-0.25** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-1.1** | 0.65 |
| % BIAŁKA | **-0.08** | 0.65 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **51** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **49** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **104** | 0.24 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **87** | 0.34 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **81** | 0.43 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **86** | 0.52 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **71** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **98** | niepożądane | | pożądane | 0.43 | 44 | 41 |
| wymię | MACE | **97** | niepożądane | | pożądane | 0.57 | 44 | 41 |
| budowa ogólna | MACE | **94** | niepożądana | | pożądana | 0.58 | 44 | 41 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **89** | niski | | wysoki | 0.81 | 44 | 41 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.60 | 44 | 41 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **93** | wąska | | szeroka | 0.56 | 44 | 41 |
| ustawienie zadu | MACE | **105** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 44 | 41 |
| szerokość zadu | MACE | **108** | wąski | | szeroki | 0.75 | 44 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **101** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 44 | 41 |
| racice | MACE | **86** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.37 | 44 | 41 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **118** | iksowate | | równolegle | 0.46 | 44 | 41 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **91** | luźne | | mocne | 0.60 | 44 | 41 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **100** | niskie | | wysokie | 0.63 | 44 | 41 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **114** | słabe | | mocne | 0.49 | 44 | 41 |
| położenie wymienia | MACE | **90** | niskie | | wysokie | 0.79 | 44 | 41 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **99** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 44 | 41 |
| długość strzyków | MACE | **83** | krótkie | | długie | 0.81 | 44 | 41 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **115** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 44 | 41 |
| charakter mleczny | MACE | **107** | ordynarny | | szlachetny | 0.52 | 44 | 41 |
| kondycja | MACE | **89** | słaba | | mocna | 0.65 | 44 | 41 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **93** | | | | 0.25 | 43 | 40 |
| temperament | MACE | **99** | | | | 0.14 | 43 | 40 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.23 | 100 | 72 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **94** | | | | 0.23 | 92 | 37 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **104** | | | | 0.21 | 125 | 89 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **104** | | | | 0.41 | 105 | 45 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |