
# UCHI BENIGN ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000055453**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000055453**<br>NUMER | **2010-02-18**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **624** | 0.51 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **-43** | 0.66 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **872** | 0.48 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **870** | 0.35 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **957** | 0.53 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1014** | 0.40 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **-769** | 0.60 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **50** | 0.74 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-3.5** | 0.67 |
| % TŁUSZCZU | **-0.06** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **-4.8** | 0.66 |
| % BIAŁKA | **-0.07** | 0.66 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | - | - |
| % LAKTOZY | - | - |
| LICZBA CÓREK | **45** | 0.74 |
| LICZBA OBÓR | **37** | 0.74 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **94** | 0.23 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **85** | 0.34 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | - | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **87** | 0.42 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **85** | 0.53 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **87** | 0.56 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **94** | niepożądane | | pożądane | 0.42 | 38 | 32 |
| wymię | MACE | **106** | niepożądane | | pożądane | 0.56 | 38 | 32 |
| budowa ogólna | MACE | **105** | niepożądana | | pożądana | 0.57 | 38 | 32 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **94** | niski | | wysoki | 0.79 | 38 | 32 |
| głębokość tułowia | MACE | **103** | płytki | | głęboki | 0.59 | 38 | 32 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **111** | wąska | | szeroka | 0.55 | 38 | 32 |
| ustawienie zadu | MACE | **117** | uniesiony | | spadzisty | 0.75 | 38 | 32 |
| szerokość zadu | MACE | **86** | wąski | | szeroki | 0.74 | 38 | 32 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **81** | pionowa | | podsiebna | 0.65 | 38 | 32 |
| racice | MACE | **99** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.36 | 38 | 32 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **74** | iksowate | | równolegle | 0.45 | 38 | 32 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **106** | luźne | | mocne | 0.59 | 38 | 32 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **93** | niskie | | wysokie | 0.61 | 38 | 32 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **90** | słabe | | mocne | 0.48 | 38 | 32 |
| położenie wymienia | MACE | **91** | niskie | | wysokie | 0.77 | 38 | 32 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **89** | szerokie | | wąskie | 0.72 | 38 | 32 |
| długość strzyków | MACE | **99** | krótkie | | długie | 0.79 | 38 | 32 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **83** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.72 | 38 | 32 |
| charakter mleczny | MACE | **94** | ordynarny | | szlachetny | 0.51 | 38 | 32 |
| kondycja | MACE | **106** | słaba | | mocna | 0.63 | 38 | 32 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | gruba | | płaska | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **104** | | | | 0.24 | 38 | 32 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.13 | 38 | 32 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.23 | 90 | 72 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **83** | | | | 0.24 | 92 | 30 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.20 | 98 | 76 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 83 | | | | 0.43 | 102 | 32 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |