
# SANTAFARM BEACON RAINY ET

NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000056136**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000056136**<br>NUMER | **2011-12-01**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **806** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **33** | 0.68 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1152** | 0.51 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1113** | 0.45 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1183** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1079** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **905** | 0.63 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **194** | 0.76 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **-2.9** | 0.69 |
| % TŁUSZCZU | **-0.12** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **7.4** | 0.68 |
| % BIAŁKA | **0.01** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **46** | 0.76 |
| LICZBA OBÓR | **42** | 0.76 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **118** | 0.37 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **117** | 0.44 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **109** | 0.49 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **111** | 0.58 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **125** | 0.59 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **126** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 38 | 34 |
| wymię | MACE | **124** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 38 | 34 |
| budowa ogólna | MACE | **125** | niepożądana | | pożądana | 0.60 | 38 | 34 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **109** | niski | | wysoki | 0.80 | 38 | 34 |
| głębokość tułowia | MACE | **108** | płytki | | głęboki | 0.62 | 38 | 34 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **96** | wąska | | szeroka | 0.60 | 38 | 34 |
| ustawienie zadu | MACE | **98** | uniesiony | | spadzisty | 0.76 | 38 | 34 |
| szerokość zadu | MACE | **111** | wąski | | szeroki | 0.75 | 38 | 34 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **104** | pionowa | | podsiebna | 0.67 | 38 | 34 |
| racice | MACE | **108** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.45 | 38 | 34 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **149** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 38 | 34 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **112** | luźne | | mocne | 0.62 | 38 | 34 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **116** | niskie | | wysokie | 0.64 | 38 | 34 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **99** | słabe | | mocne | 0.54 | 38 | 34 |
| położenie wymienia | MACE | **121** | niskie | | wysokie | 0.78 | 38 | 34 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **111** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 38 | 34 |
| długość strzyków | MACE | **87** | krótkie | | długie | 0.80 | 38 | 34 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **110** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 38 | 34 |
| charakter mleczny | MACE | **109** | ordynarny | | szlachetny | 0.55 | 38 | 34 |
| kondycja | MACE | **101** | słaba | | mocna | 0.65 | 38 | 34 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.38 | 38 | 34 |
| temperament | MACE | **113** | | | | 0.32 | 38 | 34 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **91** | | | | 0.38 | 109 | 76 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **103** | | | | 0.38 | 118 | 38 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **85** | | | | 0.37 | 129 | 88 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **116** | | | | 0.50 | 143 | 45 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |