
# QUEENSLUNCH WHITE LIQUOR ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000057094**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000057094**<br>NUMER | **2014-04-08**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **783** | 0.55 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **148** | 0.67 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1045** | 0.50 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **974** | 0.42 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1184** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1053** | 0.48 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1036** | 0.62 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **467** | 0.75 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **15.9** | 0.68 |
| % TŁUSZCZU | **-0.03** | 0.68 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **14.1** | 0.67 |
| % BIAŁKA | **-0.02** | 0.67 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **50** | 0.75 |
| LICZBA OBÓR | **44** | 0.75 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **114** | 0.34 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **96** | 0.40 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **96** | 0.46 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **113** | 0.56 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **97** | 0.57 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **147** | niepożądane | > | pożądane | 0.47 | 42 | 37 |
| wymię | MACE | **108** | niepożądane | | pożądane | 0.58 | 42 | 37 |
| budowa ogólna | MACE | **123** | niepożądana | > | pożądana | 0.59 | 42 | 37 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **126** | niski | > | wysoki | 0.80 | 42 | 37 |
| głębokość tułowia | MACE | **114** | płytki | | głęboki | 0.62 | 42 | 37 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **113** | wąska | | szeroka | 0.59 | 42 | 37 |
| ustawienie zadu | MACE | **77** | uniesiony | < | spadzisty | 0.76 | 42 | 37 |
| szerokość zadu | MACE | **112** | wąski | | szeroki | 0.75 | 42 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **70** | pionowa | < | podsiebna | 0.67 | 42 | 37 |
| racice | MACE | **138** | długa przekątna | > | krótka przekątna | 0.43 | 42 | 37 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **128** | iksowate | > | równolegle | 0.50 | 42 | 37 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **109** | luźne | | mocne | 0.62 | 42 | 37 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **114** | niskie | | wysokie | 0.64 | 42 | 37 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **105** | słabe | | mocne | 0.54 | 42 | 37 |
| położenie wymienia | MACE | **117** | niskie | | wysokie | 0.79 | 42 | 37 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **91** | szerokie | | wąskie | 0.74 | 42 | 37 |
| długość strzyków | MACE | **81** | krótkie | | długie | 0.81 | 42 | 37 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **98** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.74 | 42 | 37 |
| charakter mleczny | MACE | **122** | ordynarny | > | szlachetny | 0.55 | 42 | 37 |
| kondycja | MACE | **86** | słaba | | mocna | 0.65 | 42 | 37 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **99** | | | | 0.38 | 42 | 37 |
| temperament | MACE | **105** | | | | 0.30 | 42 | 37 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **108** | | | | 0.35 | 96 | 72 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **102** | | | | 0.35 | 77 | 35 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **94** | | | | 0.35 | 107 | 79 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | **104** | | | | 0.46 | 85 | 38 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | **-** | | | | | - | - |