
# LILY-HILL MISSOU SISTERON ET
NAZWA

| | |
|---|---|
| **JPNM000000057868**<br>NUMER MIĘDZ. | **HO**<br>RASA |
| **JP000000057868**<br>NUMER | **2016-05-19**<br>DATA UR. |




## INDEKSY

| | W | P |
|---|---|---|
| **INDEKS PF** | **818** | 0.56 |
| PODINDEKS PRODUKCYJNY | **201** | 0.69 |
| PODINDEKS ZDROWIA | **1121** | 0.52 |
| PODINDEKS PŁODNOŚCI | **1009** | 0.45 |
| PODINDEKS WYMIENIA I NÓG | **1143** | 0.59 |
| PODINDEKS FUNKCJONALNOŚCI | **1037** | 0.49 |
| **INDEKS EKONOMICZNY [PLN]** | **1403** | 0.64 |

**W** wartość
**P** powtarzalność

## CECHY PRODUKCYJNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WYDAJNOŚĆ MLEKA [KG] | **704** | 0.77 |
| WYDAJNOŚĆ TŁUSZCZU [KG] | **11.9** | 0.70 |
| % TŁUSZCZU | **-0.17** | 0.70 |
| WYDAJNOŚĆ BIAŁKA [KG] | **25.6** | 0.69 |
| % BIAŁKA | **0.02** | 0.69 |
| WYDAJNOŚĆ LAKTOZY [KG] | **-** | - |
| % LAKTOZY | **-** | - |
| LICZBA CÓREK | **56** | 0.77 |
| LICZBA OBÓR | **42** | 0.77 |

## CECHY FUNKCJONALNE

| | W | P |
|---|---|---|
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA JAŁÓWEK | **113** | 0.36 |
| WSPÓŁCZYNNIK ZAPŁODNIENIA KRÓW | **100** | 0.43 |
| PRZESTÓJ POPORODOWY | **-** | - |
| ODSTĘP MIĘDZYCIĄŻOWY | **99** | 0.50 |
| ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH | **110** | 0.59 |
| PRZEŻYWALNOŚĆ | **117** | 0.60 |

## CECHY FUNKCJONALNE - POKRÓJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rama ciała z zadem | - | - | mały | | duży | | - | - |
| siła mleczności | - | - | niepożądany | | pożądany | | - | - |
| nogi-racice | MACE | **113** | niepożądane | | pożądane | 0.49 | 40 | 32 |
| wymię | MACE | **121** | niepożądane | | pożądane | 0.59 | 40 | 32 |
| budowa ogólna | MACE | **113** | niepożądana | | pożądana | 0.61 | 40 | 32 |
| wysokość w krzyżu | MACE | **115** | niski | | wysoki | 0.81 | 40 | 32 |
| głębokość tułowia | MACE | **88** | płytki | | głęboki | 0.63 | 40 | 32 |
| szerokość klatki piersiowej | MACE | **105** | wąska | | szeroka | 0.60 | 40 | 32 |
| ustawienie zadu | MACE | **81** | uniesiony | | spadzisty | 0.77 | 40 | 32 |
| szerokość zadu | MACE | **89** | wąski | | szeroki | 0.76 | 40 | 32 |
| postawa nóg tylnych – widok z boku | MACE | **90** | pionowa | | podsiebna | 0.68 | 40 | 32 |
| racice | MACE | **103** | długa przekątna | | krótka przekątna | 0.45 | 40 | 32 |
| postawa nóg tylnych – widok z tyłu | MACE | **98** | iksowate | | równolegle | 0.51 | 40 | 32 |
| zawieszenie przednie wymienia | MACE | **122** | luźne | | mocne | 0.63 | 40 | 32 |
| zawieszenie tylne wymienia | MACE | **116** | niskie | | wysokie | 0.65 | 40 | 32 |
| więzadło środkowe wymienia | MACE | **97** | słabe | | mocne | 0.55 | 40 | 32 |
| położenie wymienia | MACE | **126** | niskie | | wysokie | 0.79 | 40 | 32 |
| szerokość wymienia | - | - | wąskie | | szerokie | | - | - |
| ustawienie strzyków | MACE | **104** | szerokie | | wąskie | 0.75 | 40 | 32 |
| długość strzyków | MACE | **102** | krótkie | | długie | 0.81 | 40 | 32 |
| ustawienie strzyków - tył | MACE | **126** | zewnętrzne | | wewnętrzne | 0.75 | 40 | 32 |
| charakter mleczny | MACE | **105** | ordynarny | | szlachetny | 0.56 | 40 | 32 |
| kondycja | MACE | **94** | słaba | | mocna | 0.67 | 40 | 32 |
| lokomocja | - | - | słaba | | dobra | | - | - |
| struktura kostna | - | - | słaba | | dobra | | - | - |

## CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szybkość oddawania mleka | MACE | **101** | | | | 0.40 | 39 | 31 |
| temperament | MACE | **89** | | | | 0.32 | 39 | 31 |

## PRZEBIEG PORODÓW

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przebieg porodu bezpośredni | MACE | **96** | | | | 0.37 | 99 | 58 |
| przebieg porodu matczyny | MACE | **114** | | | | 0.35 | 102 | 33 |
| przeżywalność cieląt bezpośredni | MACE | **99** | | | | 0.36 | 124 | 76 |

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| przeżywalność cieląt matczyny | MACE | 111 | | | | 0.47 | 131 | 40 |

## ZDROWOTNOŚĆ RACIC

| Cecha | Typ oceny | Wartość hodowlana | 80 | 100 | 120 | Powt. | Liczba córek | Liczba obór |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dermatitis digitalis | - | - | | | | | - | - |